



RETE CURE SICURE FVG



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Do Not Crush List FVG

22/02/2019

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Come interpretare l'allegato "Do Not Crush List FVG"?

L'allegato riporta i principi attivi attualmente più utilizzati nelle strutture del Friuli Venezia Giulia, nella loro forma farmaceutica solida orale.

Nel decidere come somministrare un farmaco al paziente disfagico (paziente con difficoltà a deglutire o paziente con sondino naso gastrico, PEG o PEJ), è opportuno:

1. Optare per un'altra forma farmaceutica in equivalenza terapeutica (pari indicazioni ed efficacia cliniche), che non richieda manipolazioni (vedi "FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA");
2. Se non c'è un'alternativa, consultare la scheda tecnica per seguire le indicazioni sulla possibilità e sulle modalità corrette di manipolazione della forma farmaceutica solida orale (vedi "NOTA RCP")
3. Qualora non ci siano indicazioni in RCP sulla possibilità di tritare la compressa o il contenuto della capsula, rifarsi a dati di letteratura (vedi "TRITUR."). Questi dati si riferiscono a studi di fattibilità e stabilità di preparati galenici, allestiti a partire dalla manipolazione della forma farmaceutica solida orale.
4. Quando il dato sulla triturazione deriva solo da dati di letteratura e non da indicazioni riportate in scheda tecnica, è necessario uno stretto monitoraggio clinico sull'efficacia e sicurezza del farmaco somministrato dopo manipolazione.

Legenda

ATC	Sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico
Nome Farmaco	Nome commerciale del farmaco
AIC	Autorizzazione all'Immissione in Commercio
Divisibile/ apribile	Indica la possibilità di dividere la compressa in due o più parti o di aprire la capsula (informazione tratta da scheda tecnica del farmaco)
Nota RCP	Informazioni aggiuntive riportate nella scheda tecnica del farmaco
Triturabile	Indica se la compressa o il contenuto della capsula possono essere triturati (informazione tratta da scheda tecnica del farmaco o da letteratura)
Forma farmaceutica alternativa	Forma farmaceutica alternativa, che non richiede manipolazione o richiede minore manipolazione
n.d.	Non determinato (non c'è chiara indicazione) in scheda tecnica e/o in letteratura

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A01AB15	TIBEZONIO IODURO	ANTORAL GOLA*S/ZUC20PAST.MEN	023497151	no	Da lasciare sciogliere lentamente in bocca; non masticare.	no	collutorio, spray
A02AD02	MAGALDRATO	RIOPAN*800MG 40 CPR	027103023	si	Le compresse devono essere masticate o sciolte in bocca.	si	sciroppo, buste
A02AH	SODIO BICARBONATO	SODIO BICARBONATO 500 MG 50 CPR	030580017	n.d.		si	
A02BA02	RANITIDINA CLORIDRATO	RANITIDINA RAT*150MG 20CPR	038186021	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere.	no	sciroppo
		ZANTAC 300*20 CPR 300 MG	024448058	n.d.		n.d.	sciroppo
A02BA03	FAMOTIDINA	FAMOTIDINA EG*40MG 10 CPR	034433096	no	Le compresse rivestite devono essere deglutite intere con del liquido.	no	
A02BB01	MISOPROSTOLO	CYTOTEC 200*50 CPR 200 MCG	026488015	n.d.		no	
A02BC01	OMEPRAZOLO	OMEPRAZEN - 14CPS 10MG	026803080	si	Le capsule non devono essere masticate o frantumate. I pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere di acqua, oppure mescolato con liquidi leggermente acidi, come ad esempio succhi di frutta o purea di mele o acqua non gasata. I pazienti devono essere informati che in questi casi la dispersione deve essere ingerita immediatamente (o entro 30 minuti) e che deve essere sempre mescolata appena prima di berla.	no	
		OMEPRAZEN*20MG 14 CPS RM	026803104	si		no	
A02BC02	PANTOPRAZOLO SALE SODICO SESQUIDRATO	PANTORC*20MG 14 CPR BLIS	031981044	no	Le compresse non devono essere masticate o frantumate e devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.	no	
		PANTORC*40MG 14CPR GAS. BL	031981311	no		no	
A02BC03	LANSOPRAZOLO	LANSOX - 14CPR ORODISP GASTR15MG	028600070	no	Le compresse orodispersibili possono essere disperse in una piccola quantità di acqua e somministrate attraverso un sondino nasogastrico o una siringa orale.	no	
		LANSOX - 14CPR ORODISP GASTR30MG	028600094	no		no	
		LANSOX - 14CPS GASTR 15MG	028600029	si	Per i pazienti con difficoltà di deglutizione: gli studi e la pratica clinica suggeriscono che le capsule possono essere aperte ed i granuli mescolati in una piccola quantità di acqua, succo di mela/pomodoro o disperso in una piccola quantità di cibo morbido (es. yogurt, purea di mele) per una somministrazione facilitata. Le capsule rigide possono anche essere aperte e i granuli mescolati con 40 ml di succo di mela per essere somministrati attraverso un sondino nasogastrico. Dopo aver preparato la sospensione o la mistura, il farmaco deve essere somministrato immediatamente.	no	cpr orosolubili
		LANSOX - 14CPS GASTR 30MG	028600017	si		no	cpr orosolubili
A02BC04	RABEPRAZOLO SODICO	PARIET*10MG 14 CPR	034216022	no	I pazienti devono essere avvisati di non masticare o frantumare le compresse ma di inghiottirle intere.	no	
		PARIET*20MG 14 CPR	034216186	no		no	
A02BC05	ESOMEPRAZOLO MAGNESIO DIIDRATO	ESOMEPRAZOLO EG*20MG 14 CPR	041803026	n.d.	Le compresse devono essere deglutite intere con del liquido. Le compresse non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire, le compresse possono anche essere disperse in mezzo bicchiere di acqua non gasata. Non utilizzare alcun altro liquido, in quanto il rivestimento enterico potrebbe dissolversi. Mescolare finché le compresse si disgregano e bere il liquido con i granuli immediatamente o entro 30 minuti. Sciacquare il bicchiere riempiendolo a metà con acqua, e bere. I granuli non devono essere masticati o frantumati. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire, le compresse possono essere disperse in acqua non gasata e somministrati mediante una sonda gastrica. È importante verificare attentamente l'adeguatezza della siringa e della sonda scelte.	no	granulato
A02BD08	BISKALAMMONIO CITRATO + METRONIDAZOLO + TETRACICLINA	PYLERA*140/125/125MG 120 CPS	041527019	n.d.		no	
A02BX02	SUCRALFATO	SUCRALFIN*1G 40 CPR	025822026	si	In caso di difficoltà di deglutizione è possibile disperderle in poca acqua.	n.d.	granulato per sosp. orale
A03AA04	MEBEVERINA CLORIDRATO	DUSPATAL*200MG 20 CPS RP	021377039	no	Le capsule devono essere inghiottite con una sufficiente quantità di acqua (almeno 100 ml) e non devono essere masticate, poichè il rivestimento è inteso ad assicurare un meccanismo d'azione a rilascio prolungato.	no	
A03AB06	OTILONIO BROMURO	SPASMOMEN - 30CPR RIV 40MG	023418039	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A03AX12	FLOROGLUCINOLO + MEGLUCINOLO	SPASMEX*80+80MG 20 CPR	020851046	n.d.		n.d.	
A03AX13	SIMETICONE	SIMETICONE ANG - 50CPR MAST 42MG	039631027	si	Le compresse devono essere masticate.	si	gocce orali
A03BB01	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	BUSCOPAN*10MG 30CPR RIV	006979025	no	Le compresse devono essere assunte intere con una adeguata quantità di acqua.	no	
A03CA02	CLIDINIO BROMURO + CLORDIAZEPOSSIDO	LIBRAX*20 CPR RIV. 2,5/5MG	019711035	no	Deglutire con un po' di liquido.	n.d.	
A03CA04	OTILONIO BROMURO + DIAZEPAM	SPASMOMEN SOMATICO 40*30CPR	024350023	n.d.		n.d.	
A03CA34	PROPANTELINA BROMURO + BROMAZEPAM	LEXIL*20 CPS 15/1,5MG	024045027	n.d.		n.d.	
A03DB04	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO + PARACETAMOLO	BUSCOPAN COMP.*30 CPR	029454016	no	Le compresse non devono essere masticate, ma inghiottite intere con una quantità sufficiente di acqua.	no	
A03FA01	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	PLASIL*10MG 24 CPR	020766046	n.d.		si	sciroppo
A03FA03	DOMPERIDONE	DOMPERIDONE MY - 30CPR 10MG	035810011	n.d.		si	bst, sosp orale, cpr orosol
A03FA05	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	LIMICAN*50MG 20 CPR	025575010	n.d.		n.d.	
A04AA01	ONDANSETRONE CLORIDRATO	ZOFAN*4MG 6 CPR OROD.	027612098	si		si	sciroppo
A04AD12	APREPITANT	EMEND*1CPS 125MG+2CPS 80MG	036167068	no	Le capsule rigide devono essere deglutite intere.	si	bst
A05AA	ACIDO TAUROURSOSESOSSICOLICO DIIDRATO	TAURO*250MG 20 CPS	026772032	n.d.		n.d.	
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO	DEURSIL*150MG 20 CPS	023605076	n.d.		si	sciroppo
		DEURSIL*300MG 20CPS	023605114	n.d.		si	sciroppo
		DEURSIL*450MG 20CPS RP	023605138	no		no	sciroppo
		URSACOL*40 CPR 50 MG	023630027	n.d.		si	sciroppo
A05BA03	SILIMARINA	LEGALON-140*30 CPR RIV.140MG	022258014	n.d.		n.d.	granulato effervescente,
		LEGALON-70 40 CPR RIV.70 MG	022258040	n.d.		n.d.	sciroppo
A06AB02	BISACODIL	DULCOLAX*5MG 40 CPR	008997064	no	Le compresse rivestite vanno deglutite intere.	no	
A06AB06	SENNA FOGLIA GLUCOSIDI PURI	PURSENNID*12MG 30CPR RIV	004758049	n.d.		si	
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	MOVENTIG*25 MG 30CPR	043793052	si	Per i pazienti che non sono in grado di ingoiare la compressa intera, Moventig può essere frantumato e ridotto in polvere, mescolato in mezzo bicchiere d'acqua (120 ml) e bevuto immediatamente. Il bicchiere deve essere risciacquato con un ulteriore mezzo bicchiere d'acqua (120 ml) e il contenuto bevuto. La miscela può essere somministrata anche attraverso un sondino nasogastrico (CH 8 o maggiore). È importante risciacquare con acqua il sondino nasogastrico dopo la somministrazione della miscela.	si	
A07AA06	PAROMOMICINA SOLFATO	HUMATIN*250MG 16 CPS	016531016	n.d.		si	
A07AA09	VANCOMICINA CLORIDRATO	LEVOVANOX*250 MG 4 CPS	035003033	no	Le capsule devono essere deglutite senza masticare. Nei pazienti che non siano in grado di deglutire, il trattamento può essere effettuato con vancomicina per uso endovenoso, somministrata per via orale.	no	soluzione endovenosa per uso orale
A07AA11	RIFAXIMINA	NORMIX*200MG 12 CPR	025300029	n.d.		si	granulato per sospensione orale
		TIXTELLER*550MG 56 CPR	041924046	n.d.		si	sospensione orale
A07AA12	FIDAXOMICINA	DIFICLIR*200MG 20CPR RIV	042326049	n.d.		n.d.	
A07AA51	BACITRACINA + NEOMICINA	BIMIXIN - 16CPR 25000UI+2500UI	008477061	n.d.	La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.	n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A07DA03	LOPERAMIDE CLORIDRATO	LOPERAMIDE ANG - 30CPS 2MG	024455014	n.d.		n.d.	cpr efferv. e orosolubili
A07EA06	BUDESONIDE	INTESTICORT*3MG 50CPS	036507046	no	Le capsule contenenti i granuli gastroresistenti vanno assunte circa mezz'ora prima dei pasti e vanno ingerite intere con un'abbondante quantità di liquido (es. un bicchiere d'acqua).	no	
A07EA07	BECLOMETASONE DIPROPIONATO	CLIPPER*5MG 30 CPR RP	029136037	no	Le compresse vanno ingerite intere, senza frazionarle né masticarle, con un po' d'acqua.	no	
A07EB01	SODIO CROMOGLICATO	NALCROM*100MG 20 CPS	024861015	si	Le capsule possono essere ingerite intere, oppure il contenuto in polvere può essere sciolto in una piccola quantità di acqua calda che va poi diluita con acqua fredda prima di bere.	n.d.	granulato per soluzione orale
A07EC01	SULFASALAZINA	SALAZOPYRIN EN*500MG 100 CPR	012048031	n.d.		no	
A07EC02	MESALAZINA	ARGONAL - 24CPR GASTR 800MG	034254021	n.d.		no	
		ARGONAL - 50CPR GASTR 400MG	034254019	n.d.		no	
		CLAVERSAL - 50CPR RIV 500MG	027308016	n.d.		no	
		MESAVANCOL*1200MG 60CPR RP	037734011	no	Le compresse non devono essere masticate né frantumate e devono essere assunte ai pasti.	no	
A07FA02	SACCHAROMYCES BOULARDII	CODEX*5MLD 20 CPS	029032063	n.d.		n.d.	polvere per sosp. orale
A07XA04	RACECADOTRIL	TIORFIX*100MG AD 20 CPS	037518026	n.d.		si	granulato per sosp. orale
A09AA02	PANCRELIPASI	CREON*10000 UI 100CPS RM	029018064	si	Le capsule devono essere ingerite intere senza romperle o masticarle. Se risultasse difficile deglutire le capsule, possono essere accuratamente aperte e le minimicrosfere aggiunte a cibi acidi semisolidi (pH < 5.5) che non richiedono masticazione o assunte insieme a liquidi acidi (pH < 5.5).	no	granulato gastroresistente
		CREON*25000 UI 100CPS RM	029018049	si		no	
A10BA02	METFORMINA CLORIDRATO	METFORMINA EG - 40CPR 850MG OPAC	040668042	n.d.		si	
		METFORMINA EG - 50CPR 500MG OPAC	040668079	n.d.		si	
		SLOWMET*1000MG 60CPR RP	040629065	n.d.		no	
		SLOWMET*500MG 60CPR RP	040629026	n.d.		no	
		SLOWMET*750MG 60CPR RP	040629040	n.d.		no	
		ZUGLIMET*1000MG 60CPR RIV.	038257162	si	Le compresse possono essere divise in due dosi uguali.	si	
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	GLIBEN*30 CPR 5MG	022541015	si	Divisibili a metà.	no	
A10BB07	GLIPIZIDE	MINIDIAB - 30CPR 5MG	022410017	si	Compressa divisibile; non è noto se possa essere tritata.	n.d.	
A10BB09	GLICLAZIDE	DIAMICRON*30MG 60 CPR RM	023404092	no	Si raccomanda di deglutire le compresse intere.	no	
		GLICLAZIDE MOL*80MG 40 CPR	033363019	no	Deglutire con acqua senza masticare.	no	compresse divisibili
		GLICLAZIDE TE - 30CPR 60MG RM	044883066	si	Si raccomanda di ingerire la dose senza spezzarla né masticarla.	no	
A10BB12	GLIMEPIRIDE	SOLOSA 2 MG 30 CPR CO	032117018	si	Le compresse vanno ingerite con un po' di liquido senza masticarle. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
		SOLOSA*4MG 30 CPR	032117222	si		no	
A10BD02	METFORMINA + GLIBENCLAMIDE	GLIBOMET*400+2,5MG 40CPR RIV	026129015	n.d.	Qualora non fosse disponibile un dosaggio adeguato di GLIBOMET, i singoli monocomponente devono essere utilizzati al posto dell'associazione a dose fissa.	n.d.	compresse divisibili
		GLIBOMET*400+5MG 60CPR RIV	026129041	n.d.		n.d.	
		GLICONORM*500MG+5MG 36CPR	031995018	si	La linea di incisione sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	n.d.	
		SUGUAN M*400+2,5MG 40CPR RIV	027174010	no	Le compresse vanno ingerite con un po' di acqua e senza masticare.	no	compresse divisibili
A10BD05	PIOGLITAZONE + METFORMINA	COMPETACT*15/850MG 56CPR	037225099	n.d.		n.d.	
A10BD06	PIOGLITAZONE + GLIMEPIRIDE	TANDEMACT*30+2MG 28CPR	038345144	n.d.	Le compresse devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua.	n.d.	
		TANDEMACT*30+4MG 28CPR	038345029	n.d.		n.d.	
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA	JANUMET*50/1000MG 56CPR	038672109	n.d.		n.d.	
		VELMETIA*50/850MG 56CPR	038678037	n.d.		n.d.	
		VELMETIA*50+1000MG 56CPR	038678102	n.d.		n.d.	
A10BD08	VILDAGLIPTIN + METFORMINA	EUCREAS* 50MG/ 850MG 60CPR	038252033	n.d.		n.d.	
		EUCREAS* 50MG/1000MG 60CPR	038252096	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A10BD09	PIOGLITAZONE + ALOGLIPTIN	INCRESYNC*12,5/30MG 28CPR	043030030	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.	no	
		INCRESYNC*25/30MG 28CPR	043030218	no		no	
A10BD10	SAXAGLIPTIN + METFORMINA	KOMBOGLYZE*2,5/1000MG 56CPR	041689086	n.d.		n.d.	
		KOMBOGLYZE*2,5/850MG 56CPR	041689023	n.d.		n.d.	
A10BD11	METFORMINA + LINAGLIPTIN	JENTADUETO*2,5/1000MG 56CPR	042203190	n.d.		n.d.	
		JENTADUETO*2,5/850MG 56 CPR	042203051	n.d.		n.d.	
A10BD13	METFORMINA + ALOGLIPTIN	VIPDOMET*12,5/1000MG 56CPR	043045172	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.	no	
		VIPDOMET*12,5/850MG 56CPR	043045057	no		no	
A10BD15	METFORMINA + DAPAGLIFLOZIN	XIGDUO*5MG/1000MG 56 CPR	043208091	n.d.		n.d.	
		XIGDUO*5MG/850MG 56 CPR	043208038	n.d.		n.d.	
A10BD16	METFORMINA + CANAGLIFLOZIN	VOKANAMET*150/1000MG 60CPR	043375118	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no	
		VOKANAMET*150/850MG 60CPR	043375082	no		no	
		VOKANAMET*50/1000MG 60CPR	043375056	no		no	
		VOKANAMET*50/850MG 60CPR	043375029	no		no	
A10BD20	METFORMINA + EMPAGLIFLOZIN	SYNJARDY*12,5/1000MG 56X1CPR	044229312	n.d.		n.d.	
		SYNJARDY*12,5/850MG 56X1CPR	044229223	n.d.		n.d.	
		SYNJARDY*5/1000MG 56X1CPR	044229134	n.d.		n.d.	
		SYNJARDY*5/850MG 56X1CPR	044229045	n.d.		n.d.	
A10BF01	ACARBOSE	GLUCOBAY*100MG 40 CPR	026851016	si	Le compresse di Glucobay vanno assunte intere assieme ad una piccola quantità di liquido oppure masticate e ingerite con i primi bocconi di cibo.	si	
		GLUCOBAY*50MG 40 CPR	026851028	si		si	
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	ACTOS*45MG 28 CPR	034946121	n.d.	Le compresse devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua.	n.d.	
		PIOGLITAZONE ZEN - 28CPR 15MG	040694022	n.d.		n.d.	
		PIOGLITAZONE ZEN - 28CPR 30MG	040694150	n.d.		n.d.	
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	JANUVIA*25MG 28CPR RIV.	037793027	n.d.		n.d.	
		JANUVIA*50MG 28CPR RIV.	037793080	n.d.		n.d.	
		TESAVEL*100MG 28CPR RIV.	038448142	n.d.		n.d.	
		TESAVEL*25MG 28CPR RIV.	038448027	n.d.		n.d.	
		TESAVEL*50MG 28CPR RIV.	038448080	n.d.		n.d.	
A10BH02	VILDAGLIPTIN	GALVUS*50MG 56 CPR	038144059	n.d.		n.d.	
A10BH03	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA*2,5MG 28 CPR	039453129	no	Le compresse non devono essere divise o tagliate.	no	
		ONGLYZA*5MG 28 CPR	039453028	no		no	
A10BH04	ALOGLIPTIN	VIPIDIA*12,5MG 28 CPR	043051123	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.	no	
		VIPIDIA*25MG 28 CPR	043051212	no		no	
		VIPIDIA*6,25MG 28 CPR	043051034	no		no	
A10BH05	LINAGLIPTIN	TRAJENTA*5MG 28 CPR	041401035	n.d.		n.d.	
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE*10MG 28CPR RIV	043443136	no	Le compresse possono essere assunte a stomaco pieno o vuoto; è necessario deglutirle intere con acqua.	no	
		JARDIANCE*25MG 28CPR RIV	043443047	no		no	
A10BX02	REPAGLINIDE	REPAGLINIDE EG - 90CPR 2MG	039674155	n.d.		n.d.	
		REPAGLINIDE EG*90CPR 0,5MG	039674039	n.d.		n.d.	
		REPAGLINIDE EG*90CPR 1MG	039674092	n.d.		n.d.	
A10BX09	DAPAGLIFLOZIN PRO.MON	FORXIGA - 28CPR RIV 10MG	042494070	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.	no	
A10BX11	CANAGLIFLOZIN EMIDRATO	INVOKANA - 30CPR RIV 100MG	043145022	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no	
		INVOKANA - 30CPR RIV 300MG	043145061	no		no	
A11BA	COMPLESSO VITAMINICO	PRIOVIT 12*FTE 40 PASTL. 3 G	020699031	si	Le pastiglie devono essere sciolte in bocca.	n.d.	multivitaminico generico
A11CC04	CALCITRIOLO	CALCITRIOLO TEV*30CPS0,5MCG	035297389	no	Capsula molle.	n.d.	
		ROCALTROL - 30CPS 0,25MCG	024280012	no	Capsula molle.	no	
A11DA01	TIAMINA CLORIDRATO	BENERVA*300MG 20 CPR	004642031	no		no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A11DB	BENMETIAMINA + PIRIDOSSINA + CIANOCOBALAMINA	NEURABEN*30 CPS	023585019	n.d.		n.d.	
	TIAMINA + PIRIDOSSINA + CIANOCOBALAMINA	BENEXOL*20 CPR GASTR.FLAC.	020213144	no	Le compresse vanno inghiottite con un sorso di liquido, senza masticarle né scioglierle preventivamente.	no	
A11EA	COMPLESSO VITAMINICO	BECOZYM*DOSAG.ALTO20CPR	005647033	no	Inghiottire le compresse gastroresistenti senza masticarle, con un pò di liquido.	no	multivitaminico generico
A11GA01	ACIDO ASCORBICO	CEBION*500MG 20CPR .S/ZUC	003366198	si		si	cpr eff, bst, gtt
A11HA02	PIRIDOSSINA CLORIDRATO	BENADON*300MG 10CPR RIV.	001340025	no	Le compresse non devono essere masticate e devono essere inghiottite con una sufficiente quantità di acqua.	no	
A11HA03	TOCOFEROLO, RRR-ALFA	SURSUM*400UI 30 CPS MOLLI	025910047	no	Capsula molle.	no	
A11HA05	BIOTINA	BIODERMATIN*5MG 30 CPR	010130021	n.d.		n.d.	
		DIATHYNIL*20 CPR 5 MG	028702013	si	Le compresse possono essere solubilizzate.	n.d.	
A11JA	RETINOLO + TOCOFEROLO ALFA + PIRIDOSSINA	MIDIUM*30 CPS	021773015	no	Deglutire senza masticare.	n.d.	
	RETINOLO + TOCOFEROLO, ALFA ACETATO	ROVIGON*30 CPR RIV. MAST.	012812018	si		si	
A12AA04	CALCIO CARBONATO	CALCIODIE*1000MG 30 CPR EFF.	033373010	n.d.		n.d.	
		IDRACAL - 30CPR EFF 1000MG	033486010	n.d.		n.d.	
		METOCAL*60 CPR MAST.1250MG	029472014	si		si	
A12AA20	CALCIO LATTOGLUCONATO + CALCIO CARBONATO	CALCIUM SANDOZ*500MG20CPR EF	005259015	n.d.	Le compresse effervescenti devono essere sciolte in un bicchiere d'acqua (circa 200 ml) e la soluzione ottenuta bevuta immediatamente.	n.d.	
A12AX	CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROLO	NATECAL D3 - 60CPR 600MG+400UI	034899017	si	Le compresse devono essere masticate o lasciate sciogliere in bocca, non devono essere inghiottite intere.	si	granulato
		NATECAL D3 - 60CPR ORO600MG+400UI	034899043	si	Le compresse possono essere succhiate, non devono essere ingerite intere.	si	granulato
A12BA01	POTASSIO CLORURO	LENTOKALIUM - 40CPS 600MG	024036042	n.d.		n.d.	
A12CB01	ZINCO SOLFATO EPTAIDRATO	ZINCO SO IDI*200 MG 30CPR	034684011	n.d.		n.d.	
A16AA01	LEVOCARNITINA	CARNITENE*1 G 10 CPR MAST.	018610067	si		si	soluzione orale
A16AA02	ADEMETIONINA BUSILATO	DONAMET*500MG 10 CPR GASTR.	028119093	no	Le compresse di ademetionina devono essere deglutite intere e non masticate.	no	
		SAMYR 200*20 CPR 200 MG	022865202	no		no	
		SAMYR 400*20 CPR GASTR.400MG	022865188	no	Le compresse devono essere deglutite intere e non masticate.	no	
A16AA04	MERCAPTAMINA BITARTRATO	CYSTAGON*100 CPS 150 MG	033314030	si	Ai bambini di circa sei anni o meno che potrebbero correre il rischio di aspirazione, le capsule rigide vanno aperte ed il contenuto spruzzato sul cibo. L'esperienza indica che alimenti come latte, patate ed altri prodotti amidacei sono ben adatti ad essere mescolati con la polvere di CYSTAGON. Bevande acide come succo d'arancia vanno però evitate in quanto la polvere non si mescola bene e può formare un precipitato.	n.d.	
		CYSTAGON*100 CPS 50 MG	033314016	si		n.d.	
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO	CARBAGLU*200MG 60 CPR	035983028	si	Le compresse devono essere disperse in almeno 5-10 ml d'acqua e ingerite immediatamente o somministrate mediante iniezione rapida con siringa tramite sonda nasogastrica.	n.d.	
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	AMMONAPS*250 CPR 500 MG	034701019	no	L'uso delle compresse è indicato per adulti e bambini che sono in grado di inghiottirle.	n.d.	granulato
A16AX05	ZINCO ACETATO DIIDRATO	WILZIN*25MG 250CPS	036694014	si	Nei bambini che non sono in grado di ingerire le capsule, queste vanno aperte e il loro contenuto aggiunto ad un po' d'acqua (possibilmente acqua aromatizzata con zucchero o sciroppo).	n.d.	
		WILZIN*50MG 250CPS	036694026	si		n.d.	
A16AX06	MIGLUSTAT	ZAVESCA*100MG 84 CPS	035798014	n.d.	Sicurezza per l'operatore sanitario (maschio o donna in età potenzialmente fertile): miglustat ha effetti negativi sulla spermatogenesi (motilità e morfologia degli spermatozoi) con riduzione della fertilità.	n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	KUVAN*100MG 120CPR	038922023	si	Il numero prescritto di compresse deve essere sciolto in un bicchiere o in una tazza di acqua e agitato fino alla dissoluzione. Possono essere necessari alcuni minuti perché le compresse si sciolgano. Le compresse possono essere schiacciate per dissolverle più velocemente.	n.d.	
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	GALAFOLD*123MG 14 CPS	044884017	no	Le capsule devono essere deglutite intere. Le capsule non devono essere divise, rotte o frantumate.	no	
B01AA03	WARFARIN SODICO	COUMADIN*30 CPR 5 MG	016366027	si		n.d.	
B01AA07	ACENOCUMAROLO	SINTROM*1MG 20 CPR	011782024	no	La compressa deve essere ingoiata intera con un bicchiere d'acqua.	no	
		SINTROM*4MG 20 CPR	011782012	si	Comprese quadrisecabili.	no	
B01AB	PENTOSANO POLISOLFATO SODICO	FIBRASE*50MG 50 CPS	019646052	n.d.		n.d.	
B01AC04	CLOPIDOGREL CLORIDRATO	CLOPIDOGREL MYL*75MG 28CPR	039397031	n.d.		n.d.	
		PLAVIX*300MG 30 CPR RIV.	034128052	n.d.		n.d.	
		PLAVIX*75MG 28 CPR RIV.	034128013	n.d.		n.d.	
B01AC05	TICLOPIDINA CLORIDRATO	TIKLID*250MG 30 CPR RIV	024453021	n.d.		n.d.	
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO	ACIDO ACETILS EG - 30CPR 100MG	042180048	no	Le compresse devono essere inghiottite intere con sufficiente quantità di liquido.	no	acetilsalicilato di lisina 160 mg buste pari a ac. acetilsalicilico 100 mg
	ACIDO ACETILSALICILICO + MAGNESIO IDROSSIDO + ALGELDRATO	ASCRIPITIN*20 CPR DIV.	023075029	si	La compressa è divisibile; non è noto se possa essere tritata.	n.d.	
B01AC07	DIPIRIDAMOLO	PERSANTIN*75MG 30 CPR RIV.	016521039	no	Le capsule devono essere deglutite intere senza masticare.	no	
B01AC10	INDOBUFENE	IBUSTRIN*200MG 30 CPR	025308038	si	La compressa è divisibile; non è noto se possa essere tritata.	n.d.	
B01AC22	PRASUGREL CLORIDRATO	EFIENT*10MG 28CPR RIV.	039055090	no	Non schiacciare o rompere la compressa.	no	
		EFIENT*5MG 28CPR RIV.	039055025	no		no	
B01AC23	CILOSTAZOLO	PLETAL*100MG 28CPR	034887289	n.d.		n.d.	
B01AC24	TICAGRELOR	BRILIQUE*60MG 56CPR RIV.	040546083	si	Per i pazienti che non sono in grado di deglutire la compressa intera, le compresse possono essere frantumate in una polvere fine, mescolate in mezzo bicchiere d'acqua e bevute immediatamente. Il bicchiere deve essere sciacquato con un ulteriore mezzo bicchiere d'acqua ed il contenuto bevuto. La miscela può inoltre essere somministrata attraverso un sondino naso-gastrico (CH8 o più grande). Dopo la somministrazione della miscela è importante irrigare il sondino naso-gastrico con acqua.	si	
		BRILIQUE*90MG 56CPR RIV.	040546044	si		si	
B01AC30	DIPIRIDAMOLO + ACIDO ACETILSALICILICO	AGGRENEX*200/25MG 60CPS RM	033181049	no	Le capsule devono essere inghiottite intere senza masticare.	no	
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	PRADAXA*110MG 60 CPS	038451074	no	Le capsule devono essere inghiottite intere. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule perché ciò può causare aumento del rischio di sanguinamento.	no	
		PRADAXA*150MG 60 CPS	038451112	no		no	
		PRADAXA*75MG 30CPS	038451023	no		no	
B01AF01	RIVAROXABAN	XARELTO*10MG 30 CPR	038744076	si	La compressa può essere frantumata e mescolata con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso. La dose deve essere seguita immediatamente dall'assunzione di cibo o dalla nutrizione enterale.	si	
		XARELTO*15MG 42 CPR	038744138	si		si	
		XARELTO*20MG 28 CPR	038744189	si		si	
B01AF02	APIXABAN	ELIQUIS*2,5MG 60CPR RIV	041225032	si	Le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua, succo di mela o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale. In alternativa, le compresse possono essere frantumate e sospese in 60 ml di acqua e somministrate immediatamente attraverso un sondino nasogastrico.	si	
		ELIQUIS*5MG 60 CPR RIV	041225095	si		si	
B01AF03	EDOXABAN TOSILATO	LIXIANA*30MG 28CPR RIV.	044315051	n.d.		n.d.	
		LIXIANA*60MG 28CPR RIV.	044315188	n.d.		n.d.	
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	TRANEX*30 CPS 250 MG	022019018	n.d.		n.d.	
		TRANEX*30 CPS 500 MG	022019020	n.d.		n.d.	fiale orali
		UGUROL*20 CPR 250 MG	021458017	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
B02BX05	ELTROMBOPAG	REVOLADE*25MG 28 CPR	039827023	n.d.		n.d.	
		REVOLADE*50MG 28 CPR	039827050	n.d.		n.d.	
B03AA01	FERRO (II) GLICINA SOLFATO COMPLESSO	NIFEREX*100MG 50 CPS	036743019	si	Il contenuto della capsula può essere assunto senza gli opercoli con sufficiente quantità di acqua.	no	fiale orali e gtt di ferromaltoso,
B03AA03	FERROSO GLUCONATO	LOSFERRON - 30CPR EFF 80MG(695MG)	027731013	n.d.		no	ferrigluconato e
B03AA07	FERROSO SOLFATO EPTAIDRATO	FERROGRAD - 40CPR 105MG RP	021922024	no	Le compresse non devono essere succhiate, masticate o tenute in bocca, ma devono essere deglutite intere con acqua.	no	fiale orali e gtt di ferromaltoso, ferrigluconato e ferriprotinato
B03AD03	FERROSO SOLFATO + ACIDO ASCORBICO + ACIDO FOLICO	FERROGRAD FOLIC*20CPR RP	025042033	no		no	
B03BB01	ACIDO FOLICO	FOLIDEX*400MCG 28CPR	036345015	n.d.		n.d.	
		FOLINA*5MG 20 CPS MOLLI	002309045	no	Capsula molle.	n.d.	
C01AA05	DIGOSSINA	EUDIGOX*40 CPS 0,100 MG	014166033	n.d.		n.d.	lanoxin sciroppo
		LANOXIN*0,0625MG 30 CPR	015724065	n.d.		n.d.	
		LANOXIN*0,125MG 30 CPR	015724038	n.d.		n.d.	
		LANOXIN*0,250MG 30 CPR	015724026	n.d.		n.d.	
C01AA08	METILDIGOSSINA	LANITOP*0,1 MG 30 CPR	022643011	n.d.		n.d.	
C01BA	DIIDROCHINIDINA CLORIDRATO	IDROCHINIDINA LIRCA*40 CPR	005494024	n.d.		n.d.	
C01BA03	DISOPIRAMIDE	RITMODAN*100MG 40 CPS	021894035	n.d.		si	preparazione galenica
C01BC03	PROPAFENONE CLORIDRATO	PROPAFENONE RAT*150MG 30CPR	034123012	no		no	preparazione galenica
		RYTMONORM*150MG 30 CPR RIV.	024862017	no	Per via del loro sapore amaro e per via dell'effetto anestetizzante locale del principio attivo, le compresse devono essere inghiottite intere con un sorso di liquido, a stomaco pieno.	si	
		RYTMONORM*300MG 30 CPR RIV.	024862029	no		si	
		RYTMONORM*325MG 28CPS RP	024862094	no		no	
		RYTMONORM*425MG 28CPS RP	024862106	no		no	
ALMARYTM*100MG 20CPR	025728015	si	La compressa può essere divisa in due parti uguali.	no		preparazione galenica	
C01BC04	FLECAINIDE ACETATO	FLECAINIDE TEV*100MG 20CPR	038100018	si	La compressa può essere divisa in due parti uguali.	no	
		FLEIDERINA*100MG 30 CPS RIL PROL	042864049	no		no	
		FLEIDERINA*150MG 30 CPS RIL PROL	042864064	no		no	
		FREQUIL*100MG 30 CPS RP	042854048	no		no	
C01BD01	AMIODARONE CLORIDRATO	CORDARONE*200MG 20 CPR	025035015	si	Compresse divisibili. Queste compresse possono non essere adatte per persone con intolleranza al lattosio, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.	no	preparazione galenica
C01BD07	DRONEDARONE	MULTAQ*400MG 60CPR RIV.	039589039	no	Si consiglia di deglutire la compressa intera con un bicchiere d'acqua durante il pasto. La compressa non può essere divisa in dosi uguali.	no	
C01CA17	MIDODRINA CLORIDRATO	GUTRON*2,5MG 30CPR DIV.	024519011	si		no	gocce orali
C01DA02	NITROGLICERINA	TRINITRINA*0,3MG 70CPR RIV.	006035063	si	Le compresse vanno frantumate con i denti e lasciate sciogliere sotto la lingua. La deglutizione delle compresse non è dannosa, ma annulla l'effetto terapeutico. Trinitrina compresse rivestite deve essere assunta per via sublinguale e non deglutita.	si	
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	CARVASIN*5MG 50CPR SUBL.	018269050	no	Lasciar sciogliere una compressa sotto la lingua.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO	DURONITRIN*60MG 30 CPR RP	026760013	si	Le compresse sono divisibili. Le compresse intere, o se necessario, le metà, non devono essere masticate, frantumate e devono essere inghiottite intere con mezzo bicchiere d'acqua.	no	
		ISOSORBIDE EG*60MG 30CPR RP	029558044	si	Per dividere la compressa, occorre porla su una superficie rigida con l'incisura mediana rivolta verso l'alto. Con una leggera pressione del pollice, la compressa si spezza in due parti.	no	
		MONOCINQUE RETARD*30CPS 50MG	025623024	no	Da ingerire con un po' di liquido senza masticare.	no	
		MONOCINQUE RETARD*30CPS 80MG	025623048	no		no	
		MONOCINQUE*20MG 50 CPR DIV	025623051	si		no	
		MONOCINQUE*40MG 30 CPR DIV	025623012	si		no	
		MONOKET*60MG 30CPR RM	025200041	no		no	
C01EB09	UBIDECARENONE	UBIMAIOR-50*50MG 14CPS	025228053	n.d.		n.d.	50 mg soluzione orale
C01EB15	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO	VASTAREL - 60CPR RIV 20MG	027511029	n.d.		n.d.	
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	PROCORALAN*5MG 56CPR	037061037	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
		PROCORALAN*7,5MG 56CPR	037061102	n.d.		n.d.	
C01EB18	RANOLAZINA	RANEXA*375MG 60CPR RP	038917011	no	Le compresse devono essere ingerite intere, senza frantumarle, spezzarle o masticarle. Possono essere assunte con o senza cibo.	no	
		RANEXA*500MG 60CPR RP	038917035	no		no	
		RANEXA*750MG 60CPR RP	038917050	no		no	
C02AB01	METILDOPA	ALDOMET*250MG 30 CPR	019954039	n.d.		n.d.	
		ALDOMET*500MG 30 CPR	019954015	n.d.		n.d.	
C02AC01	CLONIDINA CLORIDRATO	CATAPRESAN*150MCG 30 CPR	021502012	si	Si consiglia di iniziare il trattamento con ½-1 compressa al dì, preferibilmente la sera.	no	preparazione galenica
		CATAPRESAN*300MCG 30 CPR	021502024	si		no	
C02AC05	MOXONIDINA	FISIOTENS*0,2MG 28 CPR RIV.	034063014	n.d.		n.d.	
		FISIOTENS*0,4MG 28 CPR RIV.	034063053	n.d.		n.d.	
C02CA04	DOXAZOSIN MESILATO	CARDURA*2MG 30 CPR	026821013	si	Monosomministrazione giornaliera: la dose iniziale è di 1 mg (per questa posologia si utilizzino le compresse da 2 mg divisibili) al fine di ridurre al minimo i rischi potenziali di ipotensione e/o sincope.	no	
		CARDURA*4MG 20 CPR	026821025	si		no	
C02DC01	MINOXIDIL	LONITEN*30 CPR 5 MG	024756025	n.d.		si	
C02KX01	BOSENTAN MONOIDRATO	TRACLEER*125MG 56CPR RIV.	035609041	no	Le compresse rivestite con film devono essere deglutite con acqua.	no	preparazione galenica
		TRACLEER*32MG 56CPR DISP.	035609066	si	Le compresse dispersibili devono essere poste su un cucchiaino con un po' di acqua, il liquido deve essere mescolato per favorire la dissoluzione prima della deglutizione. Una ulteriore piccola quantità di acqua può essere aggiunta sul cucchiaino e inghiottita per essere sicuri che tutto il farmaco sia stato somministrato. Se possibile, bere un bicchiere d'acqua per assicurarsi che tutto il farmaco sia stato ingerito. Se necessario, la compressa dispersibile può essere divisa rompendola lungo le linee di sezione che sono sulla superficie. La compressa dispersibile è divisibile in quattro parti uguali.	no	
C02KX02	AMBRISENTAN	TRACLEER*62,5MG 56CPR RIV.	035609027	no	Le compresse rivestite con film devono essere deglutite con acqua.	no	
		VOLIBRIS*10MG 30 CPR RIV.	038528042	no	Si raccomanda che la compressa venga deglutita intera; essa può essere assunta con o senza cibo. Si raccomanda che la compressa non venga spezzata, rotta o masticata.	no	
		VOLIBRIS*5MG 30 CPR RIV.	038528028	no		no	
C02KX04	MACITENTAN	OPSUMIT*10MG 30 CPR	043174022	no	Le compresse rivestite con film non possono essere divise e devono essere deglutite intere con acqua.	no	
C02KX05	RIOCIQUAT	ADEMPAS*0,5MG 42CPR RIV.	043333018	si	Per i pazienti che non sono in grado di deglutire compresse intere, le compresse di Adempas possono essere frantumate e mescolate con acqua o con cibi morbidi come la composta di mele, subito prima dell'uso, e somministrate per via orale.	si	
		ADEMPAS*1,5MG 42CPR RIV.	043333071	si		si	
		ADEMPAS*1MG 42CPR RIV.	043333044	si		si	
		ADEMPAS*2,5MG 42CPR RIV.	043333133	si		si	
		ADEMPAS*2MG 42CPR RIV.	043333107	si		si	
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE	ESIDREX*25MG 20 CPR	015094016	si		si	preparazione galenica

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C03BA04	CLORTALIDONE	IGROTON*25MG 30 CPR	016861015	n.d.		n.d.	
C03BA08	METOLAZONE	ZAROXOLYN*10MG 50 CPR	024488090	si	La dose raccomandata iniziale è 2,5 mg (pari ad una mezza compressa) o 5 mg al giorno, al mattino.	no	preparazione galenica
		ZAROXOLYN*5MG 50 CPR	024488064	si		no	
C03BA11	INDAPAMIDE	INDAPAMIDE AUR*1,5MG30CPR RP	038708057	no	Da ingerire intera con acqua senza masticarla.	no	
		INDAPAMIDE SAN*2,5MG 30 CPR	033832015	n.d.		n.d.	
C03CA01	FUROSEMIDE	FUROSEMIDE TEV*500MG 20 CPR	040642011	si	La compressa può essere divisa in dosi o quarti uguali.	no	
		LASIX*25MG 30 CPR	023993013	n.d.		si	LASIX*10MG/ML OS 100 ML 023993052
C03CA04	TORASEMIDE	TORASEMIDE TEV*10MG 14 CPR	042564029	si	La linea di frattura è solo per facilitare la rottura per favorire la deglutizione e non per dividerla in dosi uguali.	si	preparazione galenica
C03DA01	SPIRONOLATTONE	ALDACTONE*25MG 16 CPS	019822028	no	Deve essere deglutito senza masticare e con una sufficiente quantità di fluidi.	si	preparazione galenica
		URACTONE - 10CPR 100MG	019408018	n.d.	La dose di 25 mg non può essere ottenuta con questo prodotto.	si	
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO	KANRENOL*100MG 20 CPR	023745072	n.d.		n.d.	
		KANRENOL*200MG 20 CPR	023745108	n.d.		n.d.	
		KANRENOL*25MG 20 CPR	023745096	n.d.		n.d.	
C03DA03	CANRENONE	LUVION*50MG 40 CPR	024273094	n.d.		n.d.	
C03DA04	EPLERENONE	EPLERENONE DOC*25MG 30 CPR	044092043	n.d.		n.d.	
C03EA01	IDROCLOROTIAZIDE + AMILORIDE	MODURETIC*5MG/50MG 20 CPR	023070016	si	Alcuni pazienti possono avere bisogno solo di mezza compressa al giorno.	no	
	IDROCLOROTIAZIDE + SPIRONOLATTONE	ALDACTAZIDE*25MG+25MG 20CPR	022702017	n.d.		si	
C03EA14	BUTIZIDE + POTASSIO CANRENOATO	KADIUR*20 CPR 5/50MG	025166024	n.d.		n.d.	
C03EB01	FUROSEMIDE + SPIRONOLATTONE	LASITONE*25MG+37MG 20CPS	023770011	no	Le capsule devono essere inghiottite intere.	n.d.	
		SPIROFUR 50*20+50MG 20 CPS	023749056	n.d.		n.d.	
C03XA01	TOLVAPTAN	SAMSCA*15MG 10CPR	039551015	no	Le compresse devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua, senza masticare.	n.d.	
C04AD03	PENTOXIFILLINA	TRENTAL*400MG 30 CPR RM	022863056	no	Le compresse vanno ingerite dopo i pasti e senza masticare.	no	
		TRENTAL*600MG 30 CPR RM	022863068	no		no	
C05CA53	DIOSMINA + ESPERIDINA	DAFLON*500MG 30 CPR RIV	023356025	n.d.		n.d.	
C07AA05	PROPRANOLOLO CLORIDRATO	INDERAL*40MG 30 CPR	020854028	n.d.		si	
C07AA07	SOTALOLO CLORIDRATO	RYTMOBETA*80MG 50 CPR	029528027	no	Uso orale. Le compresse devono essere assunte con un po' di liquido prima dei pasti. Le compresse devono essere ingerite intere.	si	
		SOTALOLO ANG*80MG 40 CPR	035751015	n.d.		si	
C07AA12	NADOLOLO	NADOLOLO SFV*80MG 30 CPR	041029012	n.d.		si	
C07AB02	METOPROLOLO TARTRATO	METOPROLOLO EG - 100CPR 100MG	029036062	no	Le compresse debbono essere ingerite senza masticarle.	no	preparazione galenica
		METOPROLOLO EG*200MG 50CPR RP	029036074	si	Da ½ a 1 cpr a rilascio prolungato da 200 mg in unica somministrazione.	no	
C07AB03	ATENOLOLO	ATENOLOLO EG - 50CPR 100MG	029776059	no	Le compresse devono essere ingerite intere con un po' di liquido prima dei pasti.	si	preparazione galenica
		ATENOLOLO EG*50MG 50 CPR	029776022	no		si	preparazione galenica
C07AB07	BISOPROLOLO EMIFUMARATO	SEQUACOR - 28CPR RIV 1,25MG	034952022	si	Le compresse provviste di tacca possono essere divise in due dosi uguali. Devono essere deglutite con del liquido e non masticate.	no	
		SEQUACOR - 28CPR RIV 10MG	034952426	si		no	
		SEQUACOR - 28CPR RIV 2,5MG	034952109	si		no	
		SEQUACOR - 28CPR RIV 3,75MG	034952186	si		no	
		SEQUACOR - 28CPR RIV 5MG	034952263	si		no	
		SEQUACOR - 28CPR RIV 7,5MG	034952349	si		no	
C07AB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO	NEBIVOLOLO SAN*5MG 28CPR	038132054	si	Le compresse possono essere divise in quattro parti uguali.	no	
C07AG01	LABETALOLO CLORIDRATO	TRANDATE*30 CPR RIV. 100 MG	023578014	n.d.		n.d.	preparazione galenica
		TRANDATE*30 CPR RIV. 200 MG	023578038	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C07AG02	CARVEDILOLO	CARAVEL - 28CPR 6,25MG	036339012	si	Compresse divisibili da 6,25 mg e 25 mg. Nell'eventualità in cui il trattamento con carvedilolo venga interrotto per più di due settimane, la terapia dovrà essere nuovamente iniziata con l'assunzione di 3,125 mg (½ compressa da 6,25 mg) due volte al giorno.	no	preparazione galenica
		CARAVEL - 30CPR 25MG	036339024	si		no	
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE	BISOP+HCT MYL*10/6,25MG 30CP	040426037	no	Le compresse devono essere deglutite con del liquido e non devono essere masticate.	no	
		BISOP+HCT MYL*2,5/6,25MG 30C	040426013	no		no	
		LODOZ* 5/6,25MG 30CPR	035583069	no		no	
C07BB12	NEBIVOLOLO + IDROCLOROTIAZIDE	LOBIDIUR*5MG+12,5MG 28CPR	039181033	si	La linea di incisione sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	si	
		LOBIDIUR*5MG+25MG 28CPR	039181096	si		si	
C07CB03	ATENOLOLO + CLORTALIDONE	ATENOL/CLORT RAT*100+25MG	033054026	n.d.		n.d.	
		TENORETIC 100MG+25MG*28 CPR	024737025	n.d.		n.d.	
		TENORETIC 50MG+12,5MG*28 CPR	024737037	n.d.		n.d.	
C08CA01	AMLODIPINA BESILATO	NORVASC*10MG 14 CPR	027428022	si	Le compresse da 5 mg possono essere divise in due parti uguali.	no	preparazione galenica
		NORVASC*5MG 28 CPR	027428010	si		no	
C08CA02	FELODIPINA	FELODIPINA RATIO - 14CPR 10MG RP	038527053	no	Dosi di felodipina 2,5 mg non sono possibili con questo medicinale. Sono disponibili altri prodotti con un dosaggio inferiore a 5 mg. Le compresse devono essere assunte al mattino e deglutite con acqua. Per mantenere le proprietà di rilascio prolungato, le compresse non devono essere divise, frantumate o masticate. Le compresse possono essere assunte senza cibo o dopo un pasto leggero povero in grassi o carboidrati.	no	
		FELODIPINA SAN*5MG 28CPR RP	037565049	no	Per la somministrazione di una dose da 2,5 mg, deve essere utilizzato un medicinale con dosaggio appropriato. Le compresse a rilascio prolungato devono essere deglutite intere e non devono essere masticate o frantumate.	no	
C08CA03	ISRADIPINA	LOMIR SRO*5MG 14CPS RP	027715046	no	Le capsule devono essere deglutite intere.	no	
C08CA05	NIFEDIPINA	ADALAT CRONO*20MG 14CPR RM	027980034	no	La compressa a rilascio modificato deve essere inghiottita intera con un po' di liquido, indipendentemente dall'orario dei pasti.	no	NIFEDICOR - OS GTT 30ML 20MG/ML
		ADALAT CRONO*30MG 14CPR RM	027980010	no		no	
		ADALAT CRONO*60MG 14CPR RM	027980022	no		no	
		ADALAT*50 CPS 10 MG	023316021	no	Le capsule vanno deglutite intere, con poco liquido, indipendentemente dai pasti.	n.d.	gocce orali
C08CA06	NIMODIPINA	PERIPLUM - 36CPR RIV 30MG	026214015	n.d.		n.d.	30 mg/0,75 ml gocce orali
C08CA08	NITRENDIPINA	BAYPRESS*20MG 28 CPR	026232013	si	Salvo diversa prescrizione medica la posologia consigliata negli adulti è la seguente: una compressa di nitrendipina una volta al giorno, alla mattina, o ½ compressa di nitrendipina due volte al giorno, alla mattina ed alla sera (20 mg di nitrendipina al giorno).	no	
C08CA09	LACIDIPINA	LACIPIL*4MG 28 CPR	027830037	si	La dose iniziale è di 2 mg (mezza compressa da 4 mg) una volta al giorno.	no	
		LACIPIL*6MG 14 CPR	027830052	si		no	
C08CA11	MANIDIPINA CLORIDRATO	VASCOMAN*28 CPR 20 MG	029200045	no	La compressa deve essere ingerita senza masticarla, con poco liquido.	no	
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	LIBRADIN*10MG 28 CPS RM	035146024	no		no	
		LIBRADIN*20MG 28 CPS RM	035146012	no		no	
C08CA13	LERCANIDIPINA CLORIDRATO	LERCANIDIPINA EG - 28CPR 10MG	039721030	si	La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	si	
		LERCANIDIPINA EG*20MG 28CPR	039721143	si	Le compresse possono essere divise in dosi uguali.	no	
C08DA01	VERAPAMIL CLORIDRATO	ISOPTIN*180MG 30 CPR RP	020609095	no	Compresse rivestite con film può essere utilizzato con una posologia compresa tra 40 e 80 mg 3 volte al giorno; le compresse sono divisibili.	no	
		ISOPTIN*240MG30CPR RP	020609069	no		no	
		ISOPTIN*40MG 30 CPR RIV.	020609018	n.d.		si	
		ISOPTIN*80MG 30 CPR RIV.	020609083	si		no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C08DB01	DILTIAZEM CLORIDRATO	TILDIEM - 24CPR 120MG RP	025278058	no	Le capsule e le compresse non devono essere masticate, ma degluite intere con un po' di liquido.	no	
		TILDIEM - 36CPS 200MG RP	025278072	no		no	
		TILDIEM*300MG 14CPS RP	025278060	no		no	preparazione galenica
		TILDIEM*60MG 50CPR RM	025278019	si		Da mezza ad una compressa tre volte al giorno.	no
C09AA01	CAPTOPRIL	CAPTOPRIL RAT*25MG 50CPR	035264047	si	La compressa può essere divisa in due metà uguali o in quarti.	no	preparazione galenica
		CAPTOPRIL RAT*50MG 24CPR	035264124	si		no	
C09AA02	ENALAPRIL MALEATO	ENAPREN*20MG 14 CPR DIV.	025682028	si	Il segno di frattura ha solo lo scopo di facilitare la rottura per rendere più agevole l'assunzione e non ha lo scopo di dividere la compressa in dosi uguali.	si	preparazione galenica
		ENAPREN*5MG 28 CPR DIV.	025682042	si		si	
C09AA03	LISINOPRIL DIIDRATO	ZESTRIL 20*20 MG 14 CPR	026834022	n.d.		si	
		ZESTRIL 5*5 MG 14 CPR	026834010	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	preparazione galenica
C09AA04	PERINDOPRIL ARGININA	COVERSYL*5MG 30 CPR RIV.	027286210	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
	PERINDOPRIL SALE DI TERT-BUTILAMMINA	PERINDOPRIL SAND - 30CPR 4MG	038764078	si	La compressa può essere divisa in due parti uguali.	no	
C09AA05	RAMIPRIL	TRIA TEC - 28CPR DIV 10MG	027161076	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali.	no	
		TRIA TEC - 28CPR DIV 2,5MG	027161052	si		no	
		TRIA TEC - 14CPR DIV 5MG	027161064	si		no	
C09AA06	QUINAPRIL CLORIDRATO	ACCUPRIN - 28CPR RIV 5MG	027217013	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali (solo per i dosaggi da 5 mg, 10 mg e 20 mg).	no	
		ACCUPRIN*20MG 14 CPR	027217037	si		no	
C09AA07	BENAZEPRIL CLORIDRATO	CIBACEN*10MG 14CPR RIV.	027516020	si	Compresse rivestite con film divisibili (con solco di frazionamento su entrambi i lati) da 10 mg.	si	
C09AA09	FOSINOPRIL SALE SODICO	FOSINOPRIL TEV*20MG 14 CPR	037594088	no	Le compresse non devono essere spezzate.	n.d.	
C09AA12	DELAPRIL	DELAKET*15MG 28 CPR	027696032	n.d.		n.d.	
C09AA15	ZOFENOPRIL SALE DI CALCIO	ZOFENOPRIL MY - 28CPR RIV 30MG	040724041	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
		ZOPRANOL - 12CPR RIV 7,5MG	034789014	si		n.d.	
C09BA01	CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	ACEDIUR*50/25MG 12 CPR	025767017	si	Compressa con barra di frattura su un lato. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
C09BA02	ENALAPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC*20/12,5MG 14CPR	027056011	n.d.		n.d.	
C09BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	ZESTORETIC*20/12,5MG 14 CPR	027482013	n.d.		n.d.	
C09BA04	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE	PERIND+IND.MYL*2/0,625 30CPR	039420043	n.d.		n.d.	
		PERIND+IND.RAT*4/1,25 30CPR	038614145	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
		PRELECTAL*5+1,25MG 30CPR	034234361	n.d.		n.d.	
		TERAXANS*10/2,5MG 30CPR	039227044	n.d.		n.d.	
C09BA05	RAMIPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	TRIA TEC HCT - 14CPR 5MG+25MG	028531022	si	La compressa può essere divisa in parti uguali.	no	
		TRIA TEC HCT*2,5/12,5MG 14CPR	028531010	si		no	
	RAMIPRIL + PIRETANIDE	PRILACE*5 MG+6 MG 14CPR DIV	029243019	si	Compresse divisibili.	no	
C09BA06	QUINAPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	ACCURETIC*20+12,5MG 14CPR R	028295018	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
C09BA09	FOSINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	FOSICOMBI*20MG/12,5MG 14CPR	029020017	n.d.		no	
C09BA12	DELAPRIL + INDAPAMIDE	DELAPRIDE*30/2,5MG 28CPR	028969020	si	Compressa bianca con linea di frattura.	si	
C09BA13	MOEXIPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	FEMIPRES PLUS*15MG/25MG14CPR	033907027	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	
C09BA15	ZOFENOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	ZOFENOPRIL ID MY - 28CPR 30+12,5	043624016	si	La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolare la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	si	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C09BB02	ENALAPRIL + LERCANIDIPINA	ZANIPRIL*20/10MG 28CPR	038502148	n.d.		n.d.	
		ZANIPRIL*20/20MG 28CPR	038502252	n.d.		n.d.	
C09BB04	PERINDOPRIL + AMLODIPINA	COVERLAM*10+10MG 30CPR	038477497	n.d.		n.d.	
		COVERLAM*10+5MG 30CPR	038477358	n.d.		n.d.	
C09BB05	RAMIPRIL + FELODIPINA	TRIAPIN*5MG+5MG 28CPR RP	034095048	no	Le compresse devono essere ingerite intere con una sufficiente quantità di liquido. Le compresse non devono essere spezzate, frantumate o masticate.	no	
C09BB07	RAMIPRIL + AMLODIPINA	PARVATI*10+5MG 28CPS	043322039	no	Si raccomanda che venga assunto ogni giorno alla stessa ora. Le capsule non devono essere masticate o sbriciolate.	n.d.	
C09BB12	DELAPRIL + MANIDIPINA	SUMMA*30+10MG 28CPR	035267018	si	Compresse divisibili. Si consiglia di raggiungere il dosaggio appropriato partendo da dosi adeguatamente ridotte, ad esempio ½ compressa/die.	no	
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA	TRIPLIAM*10+2,5+10MG 30CPRR	042407217	n.d.		n.d.	
		TRIPLIAM*5+1,25+5MG 30CPRR	042407066	n.d.		n.d.	
C09CA01	LOSARTAN POTASSICO	LORTAAN - CARD 21CPR RIV 12,5MG	029384029	no	Le compresse devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua.	no	
		LORTAAN*100MG 28CPR	029384043	no		no	
		LORTAAN*50MG 28 CPR RIV.	029384017	no	La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.	no	preparazione galenica
C09CA02	EPROSARTAN MESILATO	TEVETENZ - 28CPR RIV 600MG	033331149	n.d.		n.d.	
C09CA03	VALSARTAN	TAREG*80MG 28 CPR RIV	033178892	si	La linea di incisione sulla compressa serve solo per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	si	preparazione galenica
		TAREG*160MG 28 CPR CAL	033178942	si		si	
		TAREG*320MG 28 CPR	033178359	si		si	
		TAREG*40MG 14CPR RIV.	033178260	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	si	
C09CA04	IRBESARTAN	APROVEL*28 CPR 150 MG	033264045	n.d.		n.d.	
		APROVEL*28 CPR 300 MG	033264072	n.d.		n.d.	
C09CA06	CANDESARTAN CILEXETIL	BLOPRESS - 28CPR 8MG	033451168	si	Compresse divisibili.	no	
		BLOPRESS*16MG 28 CPR	033451269	si		no	
		BLOPRESS*32MG 28 CPR	033451360	si		no	
C09CA07	TELMISARTAN	MICARDIS - 28CPR 20MG	034328106	n.d.	Non riportato alcun dato. Le compresse di telmisartan devono essere conservate nel blister sigillato a causa delle loro caratteristiche igroscopiche.	n.d.	
		MICARDIS*40MG 28 CPR	034328029	n.d.		n.d.	
		MICARDIS*80MG 28 CPR	034328068	n.d.		n.d.	
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	OLMETEC*28 CPR 10 MG	036027011	no	Le compresse non devono essere masticate.	no	
		OLMETEC*28 CPR 20 MG	036027062	no		no	
		OLMETEC*28 CPR 40 MG	036027112	no		no	
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR*100MG+25MG 28CPR RIV	034310021	n.d.		n.d.	
		HIZAAR 50/12,5*28 CPR RIV.	032079055	si	La linea di divisione ha solo lo scopo di facilitare la rottura per rendere più agevole l'assunzione, non ha lo scopo di dividere la compressa in dosi uguali.	si	
C09DA02	EPROSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE	TIARTAN*600/12,5MG 28CPR	036772010	n.d.		n.d.	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE	COTAREG*160/12,5MG 28CPR	034114076	n.d.		n.d.	
		COTAREG*160/25MG 28CPR	034114140	n.d.		n.d.	
		COTAREG*320/12,5MG 28CPR	034114215	n.d.		n.d.	
		COTAREG*320/25MG 28CPR	034114292	n.d.		n.d.	
		COTAREG*80/12,5MG 28CPR	034114025	n.d.		n.d.	
C09DA04	IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL*150/12,5MG 28CPR	034191015	n.d.		n.d.	
		COAPROVEL*300/12,5MG 28CPR	034191041	n.d.		n.d.	
		COAPROVEL*300/25MG 28CPR	034191080	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL + IDROCLOROTIAZIDE	BLOPRESID 16/12,5* 28 CPR	034187144	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali.	no	
		BLOPRESID 32/12,5* 28 CPR	034187233	si		no	
		BLOPRESID 32/25* 28 CPR	034187322	si		no	
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE	MICARDIS PLUS*40/12,5MG28CPR	035608025	n.d.	Non riportato alcun dato. Le compresse devono essere conservate nel blister sigillato a causa delle loro caratteristiche igroscopiche.	n.d.	
		MICARDIS PLUS*80/12,5MG28CPR	035608076	n.d.		n.d.	
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL + IDROCLOROTIAZIDE	OLMEGAN*20+25MG 28 CPR	037110133	no	La compressa non deve essere masticata.	no	
		OLMEGAN*40MG+25MG 28 CPR	037110362	no		no	
		OLPREZIDE*20MG/12,5MG 28CPR	037109028	no		no	
		OLPREZIDE*40MG/12,5MG 28CPR	037109244	no	La compressa non deve essere masticata.	no	
		OLPREZIDE*40MG/25MG 28CPR	037109360	no		no	
		PLAUNAZIDE*20MG/12,5MG 28CPR	037108026	n.d.		no	
		PLAUNAZIDE*20MG/25MG 28CPR	037108139	n.d.		no	
PLAUNAZIDE*40MG/12,5MG 28CPR	037108242	n.d.	no				
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINA	BIVIS*20MG/5MG 28CPR	038947026	no	La compressa non deve essere masticata.	no	
		BIVIS*40MG/10MG 28CPR	038947242	no		no	
		GIANT*20MG/5MG 28CPR	038946012	no	La compressa non deve essere masticata.	no	
		GIANT*40MG/5MG 28CPR	038946075	no		no	
C09DX04	SACUBITRIL + VALSARTAN	ENTRESTO*24/26MG 28 CPR	044558017	no	Non divisibile.	no	
		ENTRESTO*49/51MG 56 CPR	044558031	no		no	
		ENTRESTO*97/103MG 56 CPR	044558068	no		no	
C10AA01	SIMVASTATINA	SINVACOR*10MG 20 CPR RIV.	027209016	n.d.		n.d.	
		SINVACOR*20MG 28 CPR RIV.	027209105	n.d.		n.d.	
		SINVACOR*40MG 28 CPR RIV.	027209117	n.d.		n.d.	
C10AA02	LOVASTATINA	LOVINACOR*20MG 30 CPR	035615069	n.d.		n.d.	
		LOVINACOR*40MG 30 CPR	035615057	n.d.		n.d.	
C10AA03	PRAVASTATINA SALE SODICO	PRAVASTAT.RAT*20MG 10 CPR	037517113	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	no	preparazione galenica
		PRAVASTAT.RAT*40MG 14 CPR	037517226	si		no	
C10AA04	FLUVASTATINA SALE SODICO	FLUVASTATINA TEVA - 28CPR80MG RP	038581029	no	Devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua.	no	
		LESCOL*20MG 28 CPS	029163019	no		n.d.	
		LESCOL*40MG 14 CPS	029163021	no		n.d.	
C10AA05	ATORVASTATINA SALE DI CALCIO	TORVAST*10MG 30 CPR	033007028	n.d.		n.d.	preparazione galenica
		TORVAST*20MG 30 CPR	033007042	n.d.		n.d.	preparazione galenica
		TORVAST*40MG 30 CPR	033007067	n.d.		n.d.	preparazione galenica
		TORVAST*80MG 30 CPR	033007307	n.d.		n.d.	
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	CRESTOR*10MG 28 CPR	035885058	n.d.		n.d.	
		CRESTOR*20MG 28 CPR	035885209	n.d.		n.d.	
		CRESTOR*40MG 28 CPR	035885351	n.d.		n.d.	
		CRESTOR*5MG 28 CPR	035885502	n.d.		n.d.	
C10AB02	BEZAFIBRATO	BEZALIP*400MG 30 CPR RP	024732024	no	Ingerita intera con una sufficiente quantità di liquido.	no	
C10AB04	GEMFIBROZIL	GENLIP TC - 20CPR 900MG	026737039	n.d.		n.d.	
C10AB05	FENOFIBRATO	FENOFIBRATO DOC*145MG 30CPR	041071046	no	Devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua.	n.d.	
		FULCRO - 20CPS 200MG	028590014	no	Le capsule devono essere deglutite intere durante il pasto.	n.d.	
C10AX06	OMEGA POLIENOICI	OLEVIA*1000MG 2X10 CPS	042639017	no	Si tratta di capsula molle; il suo contenuto scioglie la plastica del bicchierino.	no	
C10AX09	EZETIMIBE	ABSORCOL*10MG 30CPR	036018149	n.d.		n.d.	
C10BA02	EZETIMIBE + SIMVASTATINA	INEGY*10MG/20MG 30CPR	036679064	no	La compressa non deve essere divisa.	n.d.	
		INEGY*10MG/20MG 30CPR	036679215	no		n.d.	
		INEGY*10MG/40MG 30CPR	036679367	no		n.d.	
D01BA02	TERBINAFINA CLORIDRATO	LAMISIL*250MG 8 CPR	028176028	si	Le compresse divisibili devono essere assunte per via orale con acqua.	si	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
D05BB02	ACITRETINA	ZORIAS - 20CPS 25MG	041619065	no	Le capsule rigide devono essere assunte intere una volta al giorno con i pasti o con un bicchiere di latte.	no	
		ZORIAS - 30CPS 10MG	041619014	no		no	
D10BA01	ISOTRETINOINA	AISOSKIN 10 MG CAPSULE MOLLI	035258019	no		no	
		AISOSKIN 20 MG CAPSULE MOLLI	035258021	no		no	
D11AH04	ALITRETINOINA	TOCTINO*10MG 30CPS MOL	038849016	no		no	
		TOCTINO*30MG 30CPS MOL	038849030	no		no	
G02AB01	METILERGOMETRINA MALEATO	METHERGIN*0,125 MG 15 CPR	004225037	no		n.d.	
G02CB01	BROMOCRIPTINA MESILATO	BROMOCRIPTINA TEVA - 30CPR 2,5MG	029068018	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali.	n.d.	
G02CB03	CABERGOLINA	DOSTINEX*0,5MG 8 CPR	028988032	si		n.d.	
G03AA09	DESOGESTREL + ETINILESTRADIOLO	PRACTIL*0,15+0,03MG 21CPR	025253016	n.d.		n.d.	
	ETINILESTRADIOLO + DESOGESTREL	SECURGIN COMPRESSE 0,150 + 0,020 C.O.	027436017	n.d.		n.d.	
G03AA10	GESTODENE + ETINILESTRADIOLO	MINULET*0,075+0,03MG 21 CPR	026286029	n.d.		n.d.	
G03AA12	DROSPIRENONE + ETINILESTRADIOLO	RUBIDELLE*0,02+3MG28	041347016	n.d.		n.d.	
G03AA16	ETINILESTRADIOLO + DIENOGEST	NOVADIEN*2MG/0,03MG 21CPR	041390016	n.d.		n.d.	
G03AC09	DESOGESTREL	CERAZETTE*3X28 CPR RIV75MCG	034118024	n.d.		n.d.	
		NACREZ*28CPR RIV 75MCG	041950015	n.d.		n.d.	
G03AD01	LEVONORGESTREL	ESCAPELLE*1500MCG 1 CPR	038802017	n.d.		n.d.	
G03AD02	ULIPRISTAL (ACETATO)	ELLAONE*30MG 1CPR	039366012	n.d.		n.d.	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO	ETINILESTRAD IBSA - 25CPR1000MCG	009830047	n.d.		n.d.	
		ETINILESTRADIOLO*50MCG 25CP	009830023	n.d.		n.d.	
G03CA03	ESTRADIOLO VALERATO	PROGYNOVA*2MG 20 CPR RIV.	021226016	n.d.		n.d.	
G03DA04	PROGESTERONE	PROMETRIUM*100MG 30CPS MOLLI	029538016	no		no	
		PROMETRIUM*200MG 15CPS MOLLI	029538028	no		no	
G03DC02	NORETISTERONE ACETATO	PRIMOLUT NOR*10MG 30CPR	021053018	n.d.		n.d.	
G03HA01	CIPROTERONE ACETATO	ANDROCUR*100MG 30 CPR	023090044	si	La compressa può essere divisa in due metà uguali.	n.d.	
		ANDROCUR*50MG 25CPR	023090020	si		n.d.	
G03XA01	DANAZOLO	DANATROL*200MG 30 CPS	025021054	n.d.		n.d.	
		DANATROL*50MG 30 CPS	025021066	n.d.		n.d.	
G03XB01	MIFEPRISTONE	MIFEGYNE*200 MG 3 CPR	038704021	si	Compressa divisibile.	n.d.	
		MIFEGYNE*600 MG 1 CPR	038704033	si		n.d.	
G03XB02	ULIPRISTAL	ESMYA*5MG 28 CPR	042227013	n.d.		n.d.	
G03XC01	RALOXIFENE CLORIDRATO	EVISTA* 14 CPR 60 MG	034153015	n.d.		n.d.	
G04BD	FLAVOXATO + PROPIFENAZONE	CISTALGAN* 200+250MG 30CPR	022228074	n.d.		n.d.	
G04BD02	FLAVOXATO CLORIDRATO	GENURIN*30 CPR RIV. 200 MG	015521091	n.d.		n.d.	
G04BD04	OXIBUTININA CLORIDRATO	LYRINEL*10MG 14 CPR RP	036551137	no	La compressa deve essere ingerita intera con l'aiuto di un po' di liquido; non deve essere masticata, né divisa o frantumata.	n.d.	
		OXIBUTININA EG*5MG 30 CPR	035733043	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali. Le compresse devono essere deglutite intere, con l'ausilio di acqua.	si	
G04BD06	PROPIVERINA CLORIDRATO	MICTONORM - 28CPR RIV 15MG	037768037	n.d.		n.d.	
		MICTONORM*30MG 28CPS RM	037768138	no	Le capsule non devono essere né frantumate né masticate.	no	
G04BD07	TOLTERODINA TARTRATO	DETRUSITOL*2MG 28 CPR	034168029	n.d.		no	preparazione galenica
		DETRUSITOL*4MG RETARD 14CPS	034168169	no	Devono essere inghiottite intere.	n.d.	
G04BD08	SOLIFENACINA SUCCINATO	VESIKER*10MG 20CPR	036564185	n.d.		n.d.	
		VESIKER*5MG 30CPR	036564045	n.d.		n.d.	
G04BD09	TROSPIO CLORURO	URIVESC*20MG 30CPR RIV.	034673020	n.d.		n.d.	
G04BD11	FESOTERODINA FUMARATO	TOVIAZ*4MG 28 CPR RP	038699031	no	Le compresse devono essere assunte con un po' di liquido ed inghiottite intere.	n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
G04BD12	MIRABEGRON	BETMIGA*50MG 30CPR RP	042647103	no	La compressa deve essere assunta con liquidi, ingerita intera e non deve essere masticata, divisa o spezzata.	n.d.	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	REVATIO*20MG 90CPR	036982015	n.d.		n.d.	REVATIO*10MG/ML OS FL
		SILDENAFIL ABC - 4CPR RIV 50MG	041742040	n.d.		n.d.	32,27G
G04BE08	TADALAFIL	ADCIRCA*20MG 56CPR	039598026	n.d.		n.d.	
		CIALIS*20MG 12 CPR RIV.	035672056	n.d.		n.d.	
G04BE10	AVANAFIL	SPEDRA*100MG 12 CPR	042876072	n.d.		n.d.	
		SPEDRA*200MG 12 CPR	042876108	n.d.		n.d.	
G04CA01	ALFUZOSINA CLORIDRATO	ALFUZOSINA EG*10MG 30CPR RP	037419064	no	La compressa a rilascio prolungato deve essere ingerita intera con una quantità sufficiente di liquido.	n.d.	
		MITTOVAL*2,5MG 30 CPR RIV.	026670024	no		n.d.	
		XATRAL*10MG 30 CPR RP	027314044	no	Le compresse devono essere ingerite intere.	n.d.	
		XATRAL*2,5MG 30 CPR	027314018	no		no	
G04CA02	TAMSULOSINA CLORIDRATO	PRADIF*20 CPS 0,4 MG RM	030106013	no	La capsula deve essere deglutita intera e non deve essere frantumata o masticata.	n.d.	
G04CA03	TERAZOSINA CLORIDRATO	TERAZOSINA TEVA - 14CPR 5MG	035295120	no	Le compresse devono essere ingerite con una sufficiente quantità di liquido (cioè un bicchiere d'acqua).	n.d.	
		UNOPROST - 10CPR DIV 2MG	28652016	si		n.d.	
G04CA04	SILODOSINA	SILODYX*4MG 30 CPS	039775046	no		no	
		SILODYX*8MG 30 CPS	039775111	no		no	
G04CB01	FINASTERIDE	FINASTERIDE TEV*5MG 15 CPR	038791024	no	Devono essere prese precauzioni prima di maneggiare e somministrare il prodotto (potenziale teratogenicità). La compressa deve essere inghiottita intera e non deve essere divisa o rotta.	n.d.	
		FINASTID*5MG 15 CPR RIV.	028309019	n.d.		n.d.	
G04CB02	DUTASTERIDE	AVODART*0,5 MG 30 CPS	035895010	no		no	
H01BA02	DESMOPRESSINA ACETATO	MINIRIN/DDAVP*120MCG30CPR S	023892122	no	Da porre sotto la lingua dove dissolve senza bisogno di acqua.	no	
		MINIRIN/DDAVP*60MCG30CPR S	023892096	no		no	
H02AB01	BETAMETASONE SODIO FOSFATO	BETAMETASONE EUROGENERICI - 10CPR EFF 1MG	042827028	si	Le compresse sono divisibili a metà per facilitare l'aggiustamento della posologia. Le compresse vanno disciolte in poca acqua.	n.d.	
		BETAMETASONE EUROGENERICI - 10CPREFF 0,5MG	042827016	si		n.d.	
H02AB02	DESAMETASONE	DECADRON*0,5MG 10CPR	014729014	si		si	DECADRON GTT - SOL.
		DECADRON*0,75MG 10CPR	014729038	si		si	INIETTABILE
H02AB04	METILPREDNISOLONE	MEDROL*16MG 20 CPR DIVIS.	014159040	si	Compresse divisibili.	si	
		MEDROL*4MG 30 CPR DIVIS.	014159026	si	Compresse divisibili.	si	
H02AB07	PREDNISONE	DELTAORTENE FORTE 25MG	010089035	si		si	
		DELTAORTENE*5MG 20 CPR	010089047	si		si	
H02AB09	IDROCORTISONE	PLENADREN*20MG 50CPR RM	042487025	no	I pazienti devono essere istruiti ad assumere Plenadren oralmente con un bicchiere d'acqua al momento del risveglio, almeno 30 minuti prima di assumere cibo, preferibilmente in posizione eretta e tra le 6.00 e le 8.00 del mattino. La compressa deve essere deglutita intera, senza dividerla, romperla o frantumarla.	no	
		PLENADREN*5MG 50CPR RM	042487013	no		no	
H02AB10	CORTISONE ACETATO	CORTONE ACETATO*20 CPR 25 MG	004561015	si		si	
H02AB13	DEFLAZACORT	FLANTADIN - 10CPR 30MG	025464049	no		n.d.	DEFLAN*22,75MG/ML GTT
		FLANTADIN - 10CPR 6MG	025464037	no		n.d.	13ML

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA	EUTIROX*150MCG 50CPR	024402075	si	Sciogliere le compresse in poca acqua in modo da ottenere una sospensione da assumere con un'ulteriore aggiunta di liquido. La sospensione deve essere preparata immediatamente prima di ogni somministrazione.	si	gocce orali
		SYNTAXINE *88MCG 30CPS	041528136	no	Syntaxine può essere somministrato ai bambini, ma solo se sono in grado di deglutire una capsula intera.	no	compresse (es. EUTIROX) soluzione orale (es. TIROSINT)
		TICHE - 30CPS MOLLI 100MCG	042508162	no	Può essere somministrato ai bambini, ma solo se sono in grado di deglutire una capsula intera.	no	
		TICHE - 30CPS MOLLI 125MCG	042508224	no		no	
		TICHE - 30CPS MOLLI 25MCG	042508046	no		no	
		TICHE - 30CPS MOLLI 50MCG	042508073	no		no	
		TICHE - 30CPS MOLLI 75MCG	042508109	no		no	
H03BB02	TIAMAZOLO	TAPAZOLE*5MG 100 CPR BL	005472028	si	Il dosaggio giornaliero può essere attuato mediante la rottura della compressa.	si	
H05BX01	CINACALCETUM CLORIDRATO	MIMPARA*30MG 28 CPR	036598023	no	Le compresse devono essere assunte intere e non devono essere masticate, frantumate o divise.	no	
		MIMPARA*60MG 28 CPR	036598050	no		no	
		MIMPARA*90MG 28 CPR	036598098	no		no	
H05BX02	PARACALCITOLE	PARACALCITOLE TEVA 28 CPS MOLLI 1 MCG	043129093	no		no	
		PARACALCITOLE TEVA 28 CPS MOLLI 2 MCG	043129105	no		no	
J01AA02	DOXICICLINA ICLATO	BASSADO*10 CPR 100 MG	021635065	si	Ogni dose dovrà essere assunta durante i pasti con un'abbondante quantità d'acqua (un bicchiere colmo). Il paziente deve essere avvisato di assumere il medicinale in posizione eretta e di non coricarsi almeno per un'ora dopo l'assunzione del medicinale. Sono stati riferiti casi di esofagiti ed ulcere esofagee, talvolta gravi.	si	
J01AA07	TETRACICLINA CLORIDRATO	AMBRAMICINA*16 CPS 250 MG	008595062	no		n.d.	
J01AA08	MINOCICLINA CLORIDRATO	MINOCIN*100MG 8 CPS	022240016	no	Per evitare irritazioni esofagee, assumere il farmaco con un' adeguata quantità d'acqua, in posizione eretta o seduta e almeno 1 ora prima di andare a letto.	no	
		MINOCIN*50MG 16 CPS	022240129	no		no	
J01CA04	AMOXICILLINA TRIIDRATO	VELAMOX*1G 12CPR DISP.	023097102	si	Le compresse possono essere assunte anche previa dissoluzione in acqua.	si	
		VELAMOX*500MG 12 CPS	023097013	no		no	compresse dispersibili
J01CF05	FLUCLOXACILLINA SODICA	FLUCACID*12 CPR 1 G	033623012	si	Bambini (8-14 anni): mezza compressa.	no	
J01CR02	AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO	NEODUPLAMOX*875+125MG 12CPR	026141147	si	Compressa bianca o biancastra, a forma di capsula con impresso "AC" su entrambi i lati e una linea di frattura su un lato.	n.d.	bustine o polvere per sospensione orale
J01DB01	CEFALEXINA MONOIDRATA	KEFORAL*1G 8 CPR	022085082	n.d.		n.d.	granulato per sospensione orale
J01DC02	CEFUROXIMA AXETILE	ZINNAT*500MG 6 CPR RIV.	026915037	no	Le compresse non devono essere schiacciate e pertanto non sono adatte per il trattamento di pazienti che non possono deglutire le compresse.	no	granulato per sospensione orale
J01DC04	CEFACLORO MONOIDRATO	PANACEF RM 750*750MG 6 CPR	024227098	no	Comprese a rilascio modificato. Le compresse devono essere assunte intere, e quindi non spezzate, frantumate o masticate.	no	granulato per sospensione orale
		PANACEF*500MG 8 CPS	024227023	n.d.		n.d.	granulato per sospensione orale
J01DD08	CEFIXIMA	CEFIXORAL*400 MG 5 CPR RIV.	027134030	no	La compressa rivestita deve essere deglutita.	no	compresse dispersibili e granulato per sospensione orale
J01DD13	CEFPODOXIMA PROXETIL	CEFPODOXIMA MY - 6CPR RIV 200MG	041859087	no	Le compresse devono essere inghiottite intere con sufficiente liquido (ad esempio, un bicchiere d'acqua).	no	polvere per sospensione orale
J01DD14	CEFTIBUTEN	ISOCEF*400MG 6 CPS	027850142	n.d.		no	granulato per sospensione orale
J01DD16	CEFDITOREN PIVOXIL	GIASION*400MG 10 CPR	037146040	no	Le compresse devono essere inghiottite intere con una quantità di acqua sufficiente. Le compresse devono essere assunte durante i pasti.	no	
J01EE01	SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM	BACTRIM*16 CPR 160 MG 800 MG	021978046	si	Linea divisibilità sulla compressa.	no	compresse solubili e sospensione orale

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
J01FA02	SPIRAMICINA	ROVAMICINA - 12CPR RIV 3000000UI	012322020	no	Le compresse devono essere ingerite, senza masticarle, con abbondante liquido.	no	
J01FA07	IOSAMICINA	IOSALIDE*500MG 12CPR RIV.	024401022	n.d.		n.d.	compresse dispersibili
J01FA09	CLARITROMICINA	KLACID*250MG 12 CPR RIV	027370055	n.d.		n.d.	granulato per sospensione orale
		KLACID*500MG 14 CPR RIV.	027370129	n.d.		n.d.	granulato per sospensione orale
J01FA10	AZITROMICINA DIIDRATO	ZITROMAX AVIUM 600*8CPR600MG	027860143	si	Le compresse devono essere ingoiate intere oppure divise qualora i pazienti avessero difficoltà nella deglutizione.	no	
		ZITROMAX*500MG 3 CPR	027860042	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no	polvere per sosp. orale
J01FF01	CLINDAMICINA CLORIDRATO	DALACIN-C*150MG 12 CPS	022633059	no	Per evitare possibili irritazioni esofagee, le capsule devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua.	no	
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN*500MG 6 CPR	026664021	no	Le compresse devono essere inghiottite con un po' di liquido, senza masticarle.	no	granulato per sospensione orale
		IBIXACIN - 12CPR RIV 750MG	038360032	no	Le compresse devono essere inghiottite con un po' di liquido, senza masticarle, e possono essere assunte indipendentemente dai pasti.	no	granulato per sospensione orale
	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	CIPROFLOXAC.SAN*250MG 10CPR	037464029	no	Le compresse devono essere inghiottite con un po' di liquido, senza masticarle, e possono essere assunte indipendentemente dai pasti.	no	granulato per sospensione orale
J01MA06	NORFLOXACINA	NORFLOXACINA ABC*400MG 14CPS	025000023	no	Le capsule vanno assunte un'ora prima o due ore dopo i pasti con un bicchiere d'acqua.	no	
J01MA12	LEVOFLOXACINA EMIIDRATO	LEVOFLOXACINA SAN*250MG 5CPR	040219038	si	Possono essere divise alla linea di frattura per aggiustare la dose.	no	
		LEVOFLOXACINA SAN*500MG 5CPR	040219139	si		no	
J01MA14	MOXIFLOXACINA	MOXIFLOXACINA TEV*400MG 5CPR	040580019	no	La compressa rivestita con film deve essere deglutita intera con una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai pasti.	no	
J01MA17	PRULIFLOXACINA	UNIDROX*600MG 5 CPR	035678022	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua e devono essere somministrate tenendo conto dell'assunzione di cibo.	no	
J01XE01	NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	NEOFURADANTIN*100MG 20 CPS	027320023	no		no	
		NEOFURADANTIN*50MG 20 CPS	027320011	no		no	
J01XX08	LINEZOLID	ZYVOXID*600MG 10 CPR RIV.	035410226	no		no	granulato per sospensione orale
J02AB02	KETOCONAZOLO	KETOCONAZOLE HRA*200MG 60CPR	043781018	n.d.		n.d.	
J02AC01	FLUCONAZOLO	DIFLUCAN*100MG 10 CPS	027267044	no	Le capsule devono essere deglutite intere e indipendentemente dall'assunzione di alimenti.	no	polvere per sospensione orale
		DIFLUCAN*150 MG 2 CPS	027267020	no			
		DIFLUCAN*200MG 7 CPS	027267095	no			
		DIFLUCAN*50MG 7 CPS	027267018	no			
J02AC02	ITRACONAZOLO	SPORANOX*8 CPS 100 MG	027808017	no	La capsula non deve essere aperta e deve essere deglutita intera.	no	soluzione orale
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND*28 CPR RIV. 50 MG	035628054	no		no	polvere per sospensione orale
		VORICONAZOLO MY - 28CPRRIV 200MG	042626147	no		no	polvere per sospensione orale
J02AC04	POSACONAZOLO	NOXAFIL*100MG 24 CPR GASTR.	037059021	no	Le compresse devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere frantumate, masticate o rotte.	no	sospensione orale
J02AC05	ISAVUCONAZOLO	CRESEMBA*100MG 14 CPS	044528026	no	Le capsule devono essere ingerite intere. Le capsule non vanno masticate, frantumate, sciolte o aperte.	no	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN* 8 CPS 300 MG	021110034	no		no	sciroppo
		RIFADIN*8CPR RIV.450MG	021110097	no		no	sciroppo
J04AB04	RIFABUTINA	MYCOBUTIN*150MG 30 CPS	028426017	n.d.		no	
J04AC01	ISONIAZIDE	NICOZID*50 CPR 200 MG	006455036	n.d.		n.d.	
J04AK01	PIRAZINAMIDE	PIRALDINA*500MG 50 CPR	010800011	si		si	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
J04AK02	ETAMBUTOLO CLORIDRATO	ETAPIAM*400MG 50 CPR RIV.	021257023	n.d.		n.d.	
J04AM02	RIFAMPICINA + ISONIAZIDE	RIFINAH 300*300+150MG 24CONF	025377033	no		no	
J04AM05	ISONIAZIDE + PIRAZINAMIDE + RIFAMPICINA	RIFATER*40CPR RIV.	026981011	no		no	
J05AB01	ACICLOVIR	ACICLOVIR ABC - 35CPR 800MG	033482047	n.d.		n.d.	sospensione orale
		ZOVIRAX*200MG 25CPR	025298050	n.d.		n.d.	sospensione orale
		ZOVIRAX*400MG 25CPR	025298074	n.d.		n.d.	sospensione orale
J05AB04	RIBAVIRINA	COPEGUS*200MG 168CPR RIV.	035745025	no	A causa del potenziale teratogeno della ribavirina, le compresse non devono essere rotte o schiacciate.	no	soluzione orale
		MODERIBA*400MG 56CPR RIV.	042250023	no	A causa del potenziale teratogeno della ribavirina, le compresse non devono essere rotte o schiacciate.	no	soluzione orale
J05AB11	VALACICLOVIR CLORIDRATO	ZELITREX*1000MG 21CPR RIV.	029503024	si	Compresa bianca oblunga biconvessa con un nucleo da bianco a bianco scuro con parziale linea di incisione su entrambi i lati e con impresso su un lato il marchio "GX CF2".	n.d.	
		ZELITREX*500MG 42CPR RIV.	029503012	si	assunzione di una dose giornaliera di 500 mg suddivisa in due somministrazioni (250 mg due volte al giorno).	n.d.	
J05AB14	VALGANCICLOVIR	VALGANCICLOVIR SAN - 60CPR 450MG	043694037	no	Le compresse non devono essere rotte o frantumate. Poiché Valganciclovir Sandoz è considerato potenzialmente teratogeno e carcinogeno per l'uomo, deve essere posta attenzione nel maneggiare le compresse rotte.	no	polvere per sospensione orale
J05AB15	BRIVUDINA	BRIVIRAC*125MG 7 CPR	035720010	n.d.		n.d.	
J05AE01	SAQUINAVIR MESILATO	INVIRASE - FL 120CPR RIV 500MG	030675021	no	Le compresse di Invirase devono essere deglutite intere.	no	
J05AE03	RITONAVIR	NORVIR*100MG 30CPR RIV.	030081057	no	Le compresse rivestite con film devono essere ingoiate intere e non vanno masticate, divise o frantumate.	no	polvere per sospensione orale
J05AE07	FOSAMPRENAVIRUM SALE DI CALCIO	TELZIR*700MG 60 CPR	036475010	no		no	sospensione orale
J05AE08	ATAZANAVIRUM SOLFATO	REYATAZ*200MG 60 CPS	036196069	no	Le capsule devono essere deglutite intere.	no	
		REYATAZ*300MG 30 CPS	036196083	no		no	
J05AE10	DARUNAVIR	PREZISTA*600MG 60 CPR	037634021	no		no	sospensione orale
		PREZISTA*800MG 30 CPR	037634072	no		no	sospensione orale
J05AF01	ZIDOVUDINA	RETROVIR*250MG 40CPS BL	026697159	no		no	sciroppo
J05AF02	DIDANOSINA	VIDEX*400MG 30 CPS GASTR.	028341194	no	Le capsule gastroresistenti devono essere assunte intatte con almeno 100 ml di acqua. Bisogna spiegare ai pazienti di non aprire le capsule per facilitare la somministrazione, dal momento che ciò potrebbe ridurne l'assorbimento.	no	polvere per soluzione orale
J05AF05	LAMIVUDINA	LAMIVUDINA MY - 28CPR RIV 100MG	043569019	si	La compressa dovrebbe idealmente essere deglutita senza essere frantumata. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, le compresse possono essere frantumate ed aggiunte ad una piccola quantità di cibo semi-solido o liquido, da consumarsi immediatamente.	si	soluzione orale
		LAMIVUDINA MYL*150MG 60CPR	040485029	si		si	soluzione orale
		LAMIVUDINA MYL*300MG 30CPR	040485082	si		si	soluzione orale
J05AF06	ABACAIVIR SOLFATO	ZIAGEN*60 CPR RIV. 300 MG	034499018	si	per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, queste possono essere frantumate e aggiunte ad una piccola quantità di cibo semi-solido o liquido, il tutto deve essere assunto immediatamente.	si	sospensione orale
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	VIREAD*245 MG 30 CPR	035565011	si	In casi eccezionali, tuttavia, Viread 245 mg compresse rivestite con film può essere somministrato dopo aver disciolto la compressa in almeno 100 ml di acqua, succo di arancia o succo d'uva.	si	granulato per sospensione orale
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL	HEPSERA*10MG 30 CPR	035871019	no		si	
J05AF09	EMTRICITABINA	EMTRIVA*200MG 30 CPS FL	036585026	no		no	soluzione orale
J05AF10	ENTECAVIR	BARACLUDE*0,5MG 30CPR	037221076	no		no	
		BARACLUDE*1MG 30CPR	037221088	no		no	
J05AF11	TELBIVUDINA	SEBIVO*600MG 28CPR	037884018	no	Sebivo deve essere assunto per via orale, con o senza cibo. La compressa non deve essere masticata, suddivisa o frantumata.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
J05AG01	NEVIRAPINA	NEVIRAPINA MYL*400MG 30 CPR RIL PROL	043429024	no	Le compresse a rilascio prolungato devono essere assunte con del liquido e non devono essere né frantumate.	no	soluzione orale
		NEVIRAPINA TEVA - 60CPR 200MG	042019012	si	Compresse bianche, ovali, biconvesse. Su un lato è impresso "N", una linea di frattura e "200". La linea di frattura serve solo a facilitare la rottura della compressa, per renderne più semplice l'ingerimento e non per dividerla in parti uguali. Le compresse devono essere assunte con del liquido e non devono essere né frantumate, né masticate.	no	soluzione orale
J05AG03	EFAVIRENZ	EFAVIRENZ TEV*600MG 30X1CPR	043172016	n.d.		n.d.	
		SUSTIVA*200MG 90 CPS	034380030	si	La capsula può essere aperta e il suo contenuto può essere somministrato con una piccola quantità (1- 2 cucchiaini da thé) di cibo. La miscela deve essere somministrata appena possibile, ma non oltre 30 minuti dal mescolamento. Dopo la somministrazione della miscela efavirenz-cibo, un'ulteriore piccola quantità di cibo (circa 2 cucchiaini da thé) deve essere aggiunta nel contenitore di miscelazione vuoto, mescolata per disperdere eventuali residui del medicinale e deve essere somministrata al paziente.	n.d.	
J05AG04	ETRAVIRINA	INTELENCE*200MG 60 CPR	038703029	no	I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere con un liquido come l'acqua.	si	
J05AG05	RILPIVIRINA	EDURANT*25MG 30CPR	041664018	no	Si raccomanda che la compressa rivestita con film sia assunta intera con acqua e non sia masticata o rotta.	no	
J05AH02	OSELTAMIVIRUM FOSFATO	TAMIFLU*75MG 10 CPS RIG	035943012	no	I pazienti che non sono in grado di deglutire le capsule possono assumere dosi appropriate di Tamiflu sospensione orale.	no	sospensione orale
J05AR01	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA	LAMIV+ZIDOV MYL*150/300MG60C	041389026	si	Al fine di garantire la somministrazione dell'intera dose, la compressa deve idealmente essere deglutita senza essere rotta. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, queste possono essere frantumate e aggiunte ad una piccola quantità di cibo semi-solido o di liquido, il tutto deve essere assunto immediatamente.	si	
J05AR02	ABACAVIR + LAMIVUDINA	ABAC/LAM DRE*600/300MG 30CPR	044980011	n.d.		n.d.	
		KIVEXA*600+300MG 30 CPR	036644019	n.d.		n.d.	
J05AR03	EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	TRUVADA*200/245MG 30CPR	036716013	si	Somministrazione orale. È preferibile assumere Truvada con il cibo. Le compresse rivestite con film possono essere disciolte in circa 100 mL di acqua, succo d'arancia o succo d'uva e assunte immediatamente.	si	
J05AR04	ABACAVIR + LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA	TRIZIVIR*300+150+300MG60CPRR	034947046	no		no	
J05AR06	EFAVIRENZ + EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	ATRIPLA*600+200+245MG 30CPR	038307017	no	Le compresse di Atripla devono essere inghiottite intere con acqua, una volta al giorno.	no	
J05AR08	EMTRICITABINA + RILPIVIRINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	EVIPLERA*30 CPR	041711019	no	Eviplera deve essere assunto per via orale una volta al giorno, con del cibo. Si raccomanda di inghiottire Eviplera intero con un po' d'acqua. La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa, in quanto ciò potrebbe influenzare l'assorbimento di Eviplera.	no	
J05AR09	EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL + ELVITEGRAVIR + COBICISTAT	STRIBILD*30 CPR	042815011	no	Le compresse di Stribild devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con il cibo (vedere paragrafo 5.2). La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata.	no	
J05AR10	RITONAVIR + LOPINAVIR	KALETRA*200+50MG 120CPR RIV	035187071	no	Le compresse sono somministrate per via orale e devono essere ingoiate per intero e non vanno masticate, divise o frantumate.	no	soluzione orale
J05AR13	LAMIVUDINA + ABACAVIR + DOLUTEGRAVIR	TRIUMEQ*50/600/300MG 30CPR	043618014	n.d.		si	
J05AR14	DARUNAVIR + COBICISTAT	REZOLSTA*800/150MG 30CPR	043776018	no	Per assicurare la somministrazione dell'intera dose sia di darunavir che di cobicistat, la compressa deve essere deglutita intera.	no	
J05AR15	ATAZANAVIR + COBICISTAT	EVOTAZ*300/150MG 30CPR RIV	044318018	no	La compressa rivestita con film deve essere deglutita intera e non deve essere masticata, spezzata, divisa o frantumata.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
J05AR17	EMTRICITAVINA + TENOFOVIR ALAFENAMIDE	DESCOVY*200/10MG 30 CPR RIV. DESCOVY*200/25MG 30 CPR RIV.	044865018 044865032	no no	La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa.	no no	
J05AR18	ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINA + TENOFOVIR ALAFENAMIDE	GENVOYA*150/150/200/10MG 30C	044559019	si	La compressa rivestita con film non deve essere masticata né frantumata. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire la compressa intera, quest'ultima può essere divisa a metà ed entrambe le parti possono essere assunte una dopo l'altra, in modo da garantire l'assunzione dell'intera dose.	no	
J05AX	GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR	MAVIRET*100/40MG 84 CPR	045445018	no	I pazienti devono essere istruiti a ingerire le compresse intere, con del cibo e non devono masticare, frantumare o rompere le compresse perché ciò può alterare la biodisponibilità dei principi attivi.	no	
	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR	EPCLUSA*400/100MG 28 CPR	044928012	no	I pazienti devono essere istruiti a deglutire la compressa intera, con o senza cibo. A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film.	no	
J05AX08	RALTEGRAVIR	ISENTRESS*400MG 60CPR	038312017	no	ISENTRESS 400 mg compresse può essere somministrato con o senza cibo. Le compresse non devono essere masticate, frantumate o divise a causa dei cambiamenti previsti nel profilo farmacocinetico.	no	granulato per sospensione orale
J05AX09	MARAVIROC	CESENTRI*150MG 60CPR RIV	038138032	no		no	
		CESENTRI*300MG 60CPR RIV	038138083	no		no	
J05AX12	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY*50MG 30 CPR	043195015	no		si	
J05AX14	DACLATASVIR	DAKLINZA*30MG 28CPR	043542012	no	Daklinza deve essere assunto per via orale con o senza cibo. I pazienti devono essere avvertiti di deglutire la compressa intera. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata a causa del sapore sgradevole del principio attivo.	si	
		DAKLINZA*60MG 28 CPR	043542036	no		si	
J05AX15	SOFOSBUVIR	SOVALDI*400MG 28 CPR	043196017	no	La compressa rivestita con film è per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a deglutire la compressa intera. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata, in quanto il principio attivo ha un gusto amaro. La compressa deve essere assunta con il cibo.	no	
J05AX16	DASABUVIR	EXVIERA*250MG 56 CPR	043840014	no	Le compresse rivestite con film sono per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere (ovvero i pazienti non devono masticare, frantumare o sciogliere la compressa).	no	
J05AX65	LEDISPAVIR + SOFOSBUVIR	HARVONI*90MG/400MG 28 CPR	043731013	no	I pazienti devono essere istruiti a deglutire la compressa intera, con o senza cibo. A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film.	si	
J05AX67	OMBITASVIR + PARITAPREVIR + RITONAVIR	VIEKIRAX*12,5/75/50MG 56 CPR	043841016	no	Le compresse rivestite con film sono per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere (ovvero i pazienti non devono masticare, frantumare o sciogliere la compressa).	no	
J05AX68	ELBASVIR + GRAZOPREVIR	ZEPATIER*50MG/100MG 28 CPR	044929014	no	Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere	no	
J07AP01	VACCINO TIFOIDEO VIVO PER USO ORALE (CEPPO TY 21A)	VIVOTIF*2000 MIL 3 CPS	025219041	si	Le persone, che non sono in grado di deglutire possono versare il contenuto delle capsule in acqua fredda o tiepida. In questo caso l'acidità gastrica deve essere neutralizzata assumendo antiacidi (bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, idrossido di alluminio, ecc.) 2-3 minuti prima di prendere il vaccino.	si	
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE MONOidrato	ENDOXAN BAXTER*50MG 50CPR	015628011	no	le compresse non devono essere divise o frantumate.	no	
L01AA02	CLORAMBUCILE	LEUKERAN*2MG 25 CPR RIV.	024790026	no	La manipolazione delle compresse deve seguire le raccomandazioni che si riferiscono ai farmaci citotossici in accordo con le normative vigenti. Le compresse non devono essere divise.	no	
L01AA03	MELFALAN	ALKERAN*2MG 25 CPR RIV	021250030	no	Le compresse non devono essere divise.	no	
L01AB01	BUSULFANO	MYLERAN*2MG 100CPR	024787018	no	Le compresse non devono essere divise.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
L01AX03	TEMOZOLAMIDE	TEMOZOLOMIDE SUN* 5MG 5CPS	041333131	no	Non aprire le capsule.	no	
		TEMOZOLOMIDE SUN* 20MG 5CPS	041333156	no		no	
		TEMOZOLOMIDE SUN*100MG 5CPS	041333170	no		no	
		TEMOZOLOMIDE SUN*140MG 5CPS	041333194	no		no	
		TEMOZOLOMIDE SUN*180MG 5CPS	041333218	no		no	
		TEMOZOLOMIDE SUN*250MG 5CPS	041333232	no		no	
L01BA01	METOTREXATO SALE SODICO	METHOTREXATE*2,5MG 25CPR	019888015	n.d.		no	
L01BB02	MERCAPTOPURINA	PURINETHOL*50MG 25 CPR	010344012	n.d.		no	
L01BB03	TIOGUANINA	TIOGUANINA APN*25CPR40MG	022825018	si	Se è richiesta la suddivisione a metà di una compressa, si deve prestare attenzione per non contaminare le mani e per non inalare il farmaco.	no	
L01BC06	CAPECITABINA	CAPECITABINA MEDAC - 120CPR 500M	042501357	n.d.		no	
		CAPECITABINA MEDAC - 60CPR 150MG	042501041	n.d.		no	
L01CA04	VINOELBINA BITARTRATO	NAVELBINE*20MG 1 CPS	027865106	no	Le capsule vanno assunte con un po' d'acqua e non devono essere né masticate, né succhiate, né dissolte.	no	
		NAVELBINE*30MG 1 CPS	027865118	no		no	
L01CB01	ETOPOSIDE	VEPESID* 50MG 20 CPS	024639039	no		no	
		VEPESID*100MG 10 CPS	024639041	no		no	
L01XB01	PROCARBAZINA CLORIDRATO	NATULAN*50MG 50 CPS	020846010	n.d.		no	
L01XE01	IMATINIB MESILATO	GLIVEC*120 CPS 100 MG	035372059	n.d.		no	
		IMATINIB ACC - 120CPR RIV 100MG	042867186	n.d.		no	
L01XE02	GEFITINIB	IRESSA*250MG 30CPR RIV	039260017	no	Se non è possibile assumere la compressa intera, le compresse possono essere somministrate come una dispersione in acqua (non gasata).	no	
L01XE03	ERLOTINIB CLORIDRATO	TARCEVA*30CPR 100MG	036871022	n.d.		no	
		TARCEVA*30CPR 150MG	036871034	n.d.		no	
L01XE04	SUNITINIB	SUTENT*12,5MG 30CPS	037192022	n.d.		no	
		SUTENT*25MG 30 CPS	037192010	n.d.		no	
		SUTENT*50MG 30 CPS	037192034	n.d.		no	
L01XE05	SORAFENIB TOSILATO	NEXAVAR*200MG 112 CPR RIV	037154010	n.d.		no	
L01XE06	DASATINIB	SPRYCEL*100MG 30 CPR RIV	037400114	no	Le compresse rivestite con film non devono essere masticate o frantumate per ridurre al minimo il rischio di esposizione cutanea, devono essere deglutite intere.	no	
		SPRYCEL*140MG 30CPR RIV.	037400153	no		no	
		SPRYCEL*50MG 60 CPR RIV	037400088	no		no	
		SPRYCEL*80MG 30 CPR RIV.	037400138	no		no	
L01XE07	LAPATINIB	TYVERB*250MG 70CPR RIV.	038633044	n.d.		no	
L01XE08	NILOTINIB CLORIDRATO MONOIDRATO	TASIGNA*150MG 112 CPS	038328062	si	Per i pazienti che non riescono a deglutire le capsule rigide, il contenuto di ogni capsula rigida può essere disperso in un cucchiaino da tè di passata di mela (purea di mela) e deve essere assunto immediatamente.	no	
		TASIGNA*200MG 112 CPS	038328035	si		no	
L01XE10	EVEROLIMUS	AFINITOR*10MG 30 CPR	039398045	no	Le compresse di Afinitor devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate.	no	compresse dispersibili
		AFINITOR*5MG 30 CPR	039398019	no		no	compresse dispersibili
		VOTUBIA - 30CPR DISPERS 2MG	041397100	no	Le compresse dispersibili non devono essere rotte o frantumate.	no	
		VOTUBIA - 30CPR DISPERS 3MG	041397124	no		no	
L01XE11	PAZOPANIB (CLORIDRATO)	VOTRIENT*200MG 30 CPR	039945011	no	Le compresse rivestite con film di Votrient devono essere assunte intere con acqua e non devono essere spezzate o frantumate.	no	
		VOTRIENT*400MG 30 CPR	039945035	no		no	
L01XE12	VANDETANIB	CAPRELSA*300MG 30CPR RIV	041873023	n.d.		no	
L01XE13	AFATINIB	GIOTRIF*20MG 28X1 CPR	043023035	no	Se non è possibile deglutire le compresse intere, possono essere disperse in circa 100 ml di acqua non gassata.	no	
		GIOTRIF*30MG 28X1 CPR	043023062	no		no	
		GIOTRIF*40MG 28X1 CPR	043023098	no		no	
L01XE14	BOSUTINIB	BOSULIF*100MG 28CPR	042735011	n.d.		no	
		BOSULIF*500MG 28CPR	042735035	n.d.		no	
L01XE15	VEMURAFENIB	ZELBORAF*240MG 56 CPR	041863010	no	Le compresse devono essere inghiottite intere con acqua. Non devono essere masticate o schiacciate.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
L01XE16	CRIZOTINIB	XALKORI*60CPS 200MG	042549016	no	Le capsule devono essere deglutite intere preferibilmente con acqua e non devono essere rotte, disciolte o aperte.	no	
		XALKORI*60CPS 250MG	042549030	no		no	
L01XE17	AXITINIB	INLYTA*1MG 56CPR RIV.	042233027	no	Devono essere deglutite intere con un bicchiere di acqua.	no	
		INLYTA*3MG 56CPR RIV.	042233080	no		no	
		INLYTA*5MG 56CPR RIV.	042233054	no		no	
L01XE18	RUXOLITINIB	JAKAVI*15MG 56 CPR	042226086	n.d.		no	
		JAKAVI*20MG 56 CPR	042226112	n.d.		no	
		JAKAVI*5MG 56 CPR	042226050	n.d.		no	
L01XE21	REGORAFENIB	STIVARGA*40MG 84CPR	042925026	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no	
L01XE23	DABRAFENIB	TAFINLAR*50MG 120CPS RIG.	042923021	no	Le capsule non devono essere masticate o aperte.	no	
		TAFINLAR*75MG 120CPS RIG.	042923045	no		no	
L01XE24	PONATINIB	ICLUSIG*15MG 60CPR	042853010	no	Le compresse devono essere ingerite intere. I pazienti non devono frantumare né sciogliere le compresse.	no	
		ICLUSIG*45MG 30CPR	042853034	no		no	
L01XE25	TRAMETINIB	MEKINIST*0,5MG 30 CPR RIV.	043524026	n.d.		no	
		MEKINIST*2MG 30 CPR RIV.	043524065	n.d.		no	
L01XE27	IBRUTINIB	IMBRUVICA*140MG 1FL 90 CPS	043693011	no	Le capsule devono essere inghiottite intere con acqua e non devono essere aperte, spezzate o masticate.	no	
L01XE29	LENVATINIB	LENVIMA*10MG 30 CPS	044200020	no	Le capsule devono essere ingerite intere con acqua.	no	
		LENVIMA*4MG 30 CPS	044200018	no		no	
L01XE31	NINTEDANIB	OFEV*100MG 1X60CPS MOLLI	043827029	no	La capsula deve essere deglutita intera con acqua e non deve essere masticata o frantumata.	no	
		OFEV*150MG 1X60CPS MOLLI	043827043	no		no	
	NINTEDANIB ESILATO	VARGATEF*100MG 120CPS MOLLI	043782022	no	La capsula deve essere deglutita intera con acqua e non deve essere masticata o frantumata.	no	
L01XE33	PALBOCICLIB	IBRANCE*100MG 21 CPS	045172032	no	Le capsule devono essere ingerite intere (non devono essere masticate, frantumate o aperte).	no	
		IBRANCE*125MG 21 CPS	045172057	no		no	
L01XE35	OSIMERTINIB	TAGRISSE*80MG 28X1 CPR	044729046	no	La compressa può essere prima dispersa in 50 mL di acqua non gassata. La compressa deve essere messa nell'acqua, senza frantumarla, deve essere mescolata fino a dispersione e bevuta immediatamente.	no	
L01XE38	COBIMETINIB	COTELLIC*20MG 63CPR RIV	044551012	no	Le compresse devono essere ingerite intere.	no	
L01XX05	IDROSSICARBAMIDE	ONCO CARBIDE*20 CPS 500 MG	021510019	n.d.		no	
L01XX11	ESTRAMUSTINA FOSFATO SODICO	ESTRACYT - 40CPS 140MG	024397010	n.d.		no	
L01XX14	TRETINOINA	VESANOID*10MG 100 CPS	029838024	n.d.		no	
L01XX17	TOPOTECAN	HYCANTIN*0,25MG 10CPS RIG.	033306061	no	Le capsule non devono essere aperte o frantumate.	no	
		HYCANTIN*1MG 10CPS RIG.	033306073	no		no	
L01XX23	MITOTANO	LYSODREN*100CPR 500 MG	036560011	n.d.	Un lato è diviso a metà.	no	
L01XX25	BEXAROTENE	TARGRETIN*75MG 100 CPS	035710019	no	Le capsule non devono essere masticate.	no	
L01XX35	ANAGRELIDE CLORIDRATO	XAGRID*0,5MG 100 CPS	036745014	no	Le capsule devono essere deglutite intere. Non frantumare o diluire il contenuto in un liquido.	no	
L01XX43	VISMODEGIB	ERIVEDGE*150MG 28CPS RIG	042881019	no	Le capsule non devono essere aperte.	no	
L01XX46	OLAPARIB	LYNPARZA*50MG 448CPS	043794015	n.d.		no	
L01XX47	IDELALISIB	ZYDELIG*100MG 60 CPR	043620018	no	La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata.	no	
		ZYDELIG*150MG 60 CPR	043620020	no		no	
L01XX52	VENETOCLAX	VENCLYXTO*100MG 112 CPR RIV	045198076	no	Le compresse non devono essere masticate, frantumate o spezzate prima di essere ingerite.	no	
		VENCLYXTO*10MG 14 CPR RIV	045198025	no		no	
		VENCLYXTO*50MG 7 CPR RIV	045198049	no		no	
L02AB01	MEGESTROLO ACETATO	MEGESTIL - 30CPR 160MG	027574019	n.d.		no	
L02AB02	MEDROSSIPROGESTERONE ACETATO	FARLUTAL*30 CPR 500 MG	015148125	no	La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA	
L02BA01	TAMOXIFENE CITRATO	KESSAR 10* 30 CPR 10 MG	027433010	n.d.		no		
		KESSAR 20* 30 CPR 20 MG	027433022	n.d.		no		
L02BB01	FLUTAMIDE	FLUTAMIDE EG*250MG 21 CPR	034707012	n.d.		no		
L02BB03	BICALUTAMIDE	BICALUTAMIDE TEV*150MG 28CPR	038352124	no	Le compresse devono essere inghiottite intere .	no		
		BICALUTAMIDE TEV*50MG 28CPR	038352023	no		no		
L02BB04	ENZALUTAMIDE	XTANDI*40MG 112 CPS	042868012	no	Le capsule molli non devono essere masticate, disciolte o aperte, ma devono essere deglutite intere con acqua.	no		
L02BG03	ANASTROZOLO	ANASTROZOLO TEV*1MG 28 CPR	038101034	n.d.		no		
L02BG04	LETROZOLO	LETROZOLO TEV*2,5MG30CPR RIV	040367070	n.d.		no		
L02BG06	EXEMESTANE	AROMASIN*25MG 30 CPR RIV.	034678033	n.d.		no		
L02BX03	ABIRATERONE (ACETATO)	ZYTIGA*250MG 120CPR	041427016	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no		
L04AA06	ACIDO MICOFENOLICO SALE DI MOFETILE	MYFENAX*250MG 100CPS	039696012	no	Micofenolato mofetile esercita effetti teratogeni: le capsule non devono pertanto essere aperte né rotte per evitare l'inalazione della polvere contenuta nelle capsule o il contatto diretto tra quest'ultima e la cute o le mucose. In tal caso lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone e sciacquare gli occhi con acqua corrente. Le capsule non devono pertanto essere aperte né rotte.	no	soluzione orale	
		MYFENAX*500MG 50CPR	039696036	no	Micofenolato mofetile esercita effetti teratogeni, le compresse non devono essere rotte.	no	soluzione orale	
	ACIDO MICOFENOLICO SALE SODICO	MYFORTIC*180MG 100 CPR	036511032	no	Al fine di mantenere integro il rivestimento enterico le compresse di Myfortic non devono essere frantumate.	no	soluzione orale	
		MYFORTIC*360MG 50 CPR	036511069	no		no	soluzione orale	
L04AA10	SIROLIMUS	RAPAMUNE*0,5MG 100 CPR	035120120	no	La biodisponibilità non è stata determinata per le compresse dopo che siano state frantumate, masticate o spezzate e pertanto ciò non può essere consigliato.	no	soluzione orale	
		RAPAMUNE*1MG 100 CPR	035120070	no		no	soluzione orale	
		RAPAMUNE*2MG 30 CPR	035120094	no		no	soluzione orale	
L04AA13	LEFLUNOMIDE	ARAVA - 3CPR RIV 100MG	034702098	no	Le compresse devono essere assunte intere.	no		
		ARAVA*20MG 30 CPR FLAC.	034702074	no		no		
L04AA18	EVEROLIMUS	CERTICAN*0,25MG 60CPR	036373025	no	Le compresse di Certican devono essere ingerite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere frantumate prima dell'uso.	no	compresse dispersibili	
		CERTICAN*0,75MG 60CPR	036373102	no		no	compresse dispersibili	
		CERTICAN*0,25MG 60CPR DIS	036373227	n.d.		no		
L04AA27	FINGOLIMOD (CLORIDRATO)	GILENYA*0,5MG 28 CPS RIG.	040949051	n.d.		no		
L04AA31	TERIFLUNOMIDE	AUBAGIO*14MG 28 CPR	042921027	no	Le compresse devono essere deglutite intere.	no		
L04AA32	APREMILAST	OTEZLA*10/20/30MG 27 CPR	043867011	no	Le compresse rivestite con film devono essere ingerite intere.	no		
		OTEZLA*30MG 56 CPR	043867023	no		no		
L04AD01	CICLOSPORINA	CIQORIN*100MG 30 CPS MOLLI	042787200	no	Le capsule di ciclosporina devono essere inghiottite intere.	no	soluzione orale	
		CIQORIN*10MG 50 CPS MOLLI	042787034	no		no	soluzione orale	
		CIQORIN*25MG 50 CPS MOLLI	042787097	no		no	soluzione orale	
		CIQORIN*50MG 50 CPS MOLLI	042787150	no		no	soluzione orale	
L04AD02	TACROLIMUS	ADOPORT - 30CPS 0,5MG	041180062	n.d.	Le capsule devono essere assunte immediatamente dopo la rimozione dal blister. Le capsule devono essere deglutite con del liquido (preferibilmente acqua). Se necessario, sospendere in acqua il contenuto delle capsule e somministrare per mezzo di intubazione nasogastrica.	no		
		ADOPORT - 30CPS 5MG	041180264	n.d.		no		
		ADOPORT - 60CPS 1MG	041180187	n.d.		no		
		ADVAGRAF*3MG 30CPS RM	038218119	no		Le capsule devono essere assunte intere.	no	
		ADVAGRAF*5MG 30CPS RM	038218071	no			no	
		ENVARUSUS*0,75MG 30 CPR	043531019	no			no	
	TACROLIMUS MONOIDRATO	ENVARUSUS*1MG 60 CPR	043531058	no	Le compresse devono essere ingerite intere.	no		
		ENVARUSUS*4MG 30 CPR	043531072	no		no		
L04AX01	AZATIOPRINA	ADVAGRAF - 30CPS 0,5MG RP	038218018	no	Le capsule devono essere assunte intere.	no		
		ADVAGRAF - 60CPS 1MG RP	038218057	no		no		
L04AX02	TALIDOMIDE	THALIDOMIDE CEG*50MG 28CPS	020957039	no	Le compresse ricoperte di non devono essere divise.	no		
L04AX02	TALIDOMIDE	THALIDOMIDE CEG*50MG 28CPS	038572018	n.d.		no		

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
L04AX04	LENALIDOMIDE	REVLIMID*10MG 21 CPS	038016022	no	Le capsule devono essere deglutite intere.	no	
		REVLIMID*15MG 21 CPS	038016034	no		no	
		REVLIMID*2,5MG 21 CPS	038016059	no		no	
		REVLIMID*25MG 21 CPS	038016046	no		no	
		REVLIMID*5MG 21 CPS	038016010	no		no	
L04AX05	PIRFENIDONE	ESBRIET*267MG 63 CPS	041271014	no	Le capsule devono essere ingerite intere.	no	
L04AX06	POMALIDOMIDE	IMNOVID*1MG 21CPS RIG.	042927018	no	Le capsule non devono essere aperte o frantumate.	no	
		IMNOVID*2MG 21CPS RIG.	042927020	no		no	
		IMNOVID*3MG 21CPS RIG.	042927032	no		no	
		IMNOVID*4MG 21CPS RIG.	042927044	no		no	
M01AB01	INDOMETACINA	INDOXEN*25 CPS 25 MG	020676019	no	Ingerire intere a stomaco pieno.	no	
		INDOXEN*25 CPS 50 MG	020676021	no		no	
M01AB05	DICLOFENAC SODICO	DICLOFENAC HEX*50MG 30 CPR	032786028	no	Le compresse vanno deglutite intere con un po' di liquido e non devono essere frantumate o masticate	no	
		DICLOREUM *150MG 20CPS R.P.	024515114	no	La preparazione in capsule a rilascio prolungato possiede particolari caratteristiche in quanto i granuli, in essa contenuti, sono idonei a ricoprire e proteggere il principio attivo onde evitarne il contatto immediato e diretto con la mucosa gastrica e favorirne il lento rilascio. La formulazione capsule a rilascio prolungato consente pertanto la monosomministrazione di una dose giornaliera di diclofenac sodico.	no	
		FLOGOFENAC*100MG21CPS RP	025536020	no	Le capsule vanno deglutite intere con un po' di liquido.	no	
M01AB15	KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	TORADOL*10MG 10CPR RIV.	027253032	no		no	gocce
M01AB16	ACECLOFENAC	AIRTAL*100MG 40CPR RIV	032773020	no	Le compresse rivestite vanno ingerite con un sufficiente quantitativo di acqua.	no	polvere per sosp. orale
M01AC01	PIROXICAM	PIROXICAM EG*20MG 30 CPS	029534029	no	La compressa deve essere deglutita con un po' d'acqua.	no	
M01AC06	MELOXICAM	MELOXICAM EG*15MG 30 CPR	037077221	si	La compressa puo essere divisa in due dosi uguali. La dose totale giornaliera deve essere assunta come dose singola durante i pasti, ingerita con acqua o altro liquido.	no	
		MELOXICAM MYL*7,5MG 30 CPR	037069073	si	La linea di frattura serve solo per facilitare la rottura della compressa, per rendere piu semplice la deglutizione, e non per dividerla in due dosi uguali.	no	
M01AE01	IBUPROFENE	BRUFEN*600MG 30CPR	022593216	no	Assumere BRUFEN compresse con abbondante acqua. Per evitare fastidio orale ed irritazione della gola le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate, rotte o succhiate.	no	
		IBUPROFENE DOC*600MG 30CPR	043109038	no	Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con acqua. Nei pazienti con sensibilità gastrica si raccomanda l'assunzione di ibuprofene durante i pasti.	no	granulato e sciroppo
		NUROFEN*200MG 24CPR RIV.	025634041	no		no	granulato e sciroppo
	IBUPROFENE SALE DI ARGININA	SPIDIDOL*400MG 12 CPR RIV.	039600010	no		no	granulato
M01AE02	NAPROXENE	NAPROSYN*500MG 30CPR GASTR.	023177215	no	Formulazione gastroprotetta, quindi particolarmente indicata in tutti quei pazienti nei quali non è consigliata la dissoluzione del farmaco nello stomaco.	no	granulato per sospensione orale
M01AE03	KETOPROFENE	IBIFEN*30 CPS 50 MG	024994117	no		no	granulato eff., gocce orali

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
M01AH01	CELECOXIB	CELEBREX*200MG 20CPS	034624460	si	Per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire le capsule, il contenuto di una capsula di celecoxib può essere aggiunto a mousse di mela, crema di riso, yogurt o banana schiacciata. In questo caso, svuotare attentamente l'intero contenuto della capsula in un cucchiaino raso di mousse di mela, crema di riso, yogurt o banana schiacciata freddi o a temperatura ambiente e ingerire immediatamente con 240 ml di acqua. Il contenuto della capsula versato su mousse di mela, crema di riso o yogurt è stabile per un massimo di 6 ore in frigorifero (2-8 °C). Il contenuto della capsula versato sulla banana schiacciata non deve essere conservato in frigorifero e deve essere ingerito immediatamente.	no	
M01AH05	ETORICOXIB	TAUXIB CPR 120 MG	035890425	no		no	
		TAUXIB*60MG 20 CPR RIV.	035890060	no		no	
		TAUXIB*90MG 20 CPR RIV.	035890209	no		no	
M01AX17	NIMESULIDE	AULIN*100MG 30 CPR	025940026	no		no	granulato per sospensione orale
M03BX01	BACLOFENE	BACLOFENE MYL*10MG 50CPR	037930017	si	Le compresse sono divisibili e devono essere assunte durante i pasti con un po' di liquido.	no	
		LIORESAL*25MG 50 CPR	022999027	no		no	
M03BX02	TIZANIDINA CLORIDRATO	SIRDALUD*2MG 20 CPR	025852068	n.d.		n.d.	
		SIRDALUD*4MG 30 CPR	025852029	n.d.		n.d.	
		SIRDALUD*6MG 30 CPR	025852031	n.d.		n.d.	
M03BX03	PRIDINOLO MESILATO	LYSEEN*30 CPR 4 MG	011987017	si		no	
M03BX05	TIOCOLCHICOSIDE	MUSCORIL*4MG 30 CPS	015896107	no		no	compresse orodispersibili
M03BX09	EPERISONE CLORIDRATO	EXPOSE*100MG 30 CPR RIV.	028631024	no		no	
M04AA01	ALLOPURINOLO	ZYLORIC - 30CPR DIV 300MG	021259027	si		si	
		ZYLORIC - 50CPR DIV 100MG	021259015	si		si	
M04AA03	FEBUXOSTAT	ADENURIC*120MG 28CPR RIV.	039538032	no		no	
		ADENURIC*80MG 28CPR RIV.	039538018	no		no	
M04AC01	COLCHICINA	COLCHICINA LIRCA*60 CPR 1MG	009964038	si	La compressa può essere deglutita intera o spezzata a metà lungo la linea di frattura, per ottenere la dose singola di 0.5 mg.	si	
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO	ADRONAT - 4CPR 70MG	029053079	no	Deve essere deglutito almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o farmaco della giornata insieme solo ad acqua di rubinetto. E' probabile che altre bevande (inclusa l'acqua minerale), alimenti e alcuni farmaci riducano l'assorbimento di alendronato. ADRONAT deve essere deglutito solo dopo essersi alzati dal letto per iniziare la giornata, con un bicchiere colmo d'acqua di rubinetto (non meno di 200 ml). Il paziente deve deglutire ADRONAT solo intero. Il paziente non deve frantumare o masticare o sciogliere in bocca la compressa, a causa del rischio potenziale che si verifichino ulcerazioni orofaringee. Il paziente non deve distendersi fintanto che non abbia mangiato qualcosa, il che deve avvenire almeno 30 minuti dopo l'assunzione della compressa. Il paziente non deve distendersi per almeno 30 minuti dopo aver assunto ADRONAT. Non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all'inizio della giornata.	si	soluzione orale (BONASOL)

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
M05BA06	ACIDUM IBANDRONICUM SALE MONOSODICO MONOIDRATO	ACIDO IBANDR TEVA - 1CPR 150MG	040366039	no	Deve essere assunto dopo un digiuno notturno (di almeno 6 ore) e 1 ora prima dell'assunzione di cibi e bevande (a parte l'acqua) del mattino. Le compresse devono essere deglutite intere con l'aiuto di un bicchiere di acqua (da 180 a240 mL) con la paziente in posizione seduta o in piedi. Non deve essere utilizzata acqua ad elevata concentrazione di calcio. Si consiglia di utilizzare acqua in bottiglia con un basso contenuto di minerali se c'è un problema associato a livelli potenzialmente elevati di calcio nell'acqua delrubinetto (acqua dura). Le pazienti non devono sdraiarsi per 1 ora dopo l'assunzione di Acido Ibandronico Teva. L'acqua è l'unica bevanda che può essere assunta con Acido Ibandronico Teva. Le pazienti non devono né masticare né succhiare la compressa per il rischio di ulcerazioni orofaringee.	no	
		BONDRONAT*50MG 28 CPR	036570012	no	Le compresse di Bondronat devono essere assunte dopo un digiuno notturno (di almeno 6 ore) e prima dell'assunzione di cibi e bevande al mattino. Si devono anche evitare medicinali e integratori (compreso il calcio) prima di assumere le compresse di Bondronat. Il digiuno deve essere proseguito per almeno 30 minuti dopo avere assunto la compressa. L'acqua può essere bevuta in qualsiasi momento durante il trattamento con Bondronat (vedere paragrafo 4.5). Non deve essere utilizzata acqua ad elevata concentrazione di calcio. Si consiglia di utilizzare acqua in bottiglia con un basso contenuto di minerali se c'è un problema associato a livelli potenzialmente elevati di calcio nell'acqua del rubinetto (acqua dura), - Le compresse devono essere deglutite intere con un bicchiere pieno di acqua naturale (da 180 a 240 ml) mentre la paziente è in posizione seduta o in piedi. - Le pazienti non devono sdraiarsi per 60 minuti dopo l'assunzione di Bondronat. - Le pazienti non devono masticare, succhiare o schiacciare la compressa per il rischio di ulcerazione orofaringea. - Acqua naturale è l'unica bevanda che deve essere assunta con Bondronat.	no	
M05BA07	ACIDO RISEDRONICO SALE SODICO	CEDRAVIS - 4CPR RIV 35MG	039554011	no	Assumere risedronato sodico: prima della colazione: almeno 30 minuti prima di ingerire il primo cibo, altri prodotti medicinali o bevande del giorno (eccezione fatta per l'acqua di rubinetto). La compressa deve essere deglutita intera e non sciolta in bocca o masticata. Per favorire il transito esofageo della compressa assumere risedronato sodico con un bicchiere di acqua di rubinetto (≥120 ml) mantenendo il busto in posizione eretta (in piedi o seduti). Una volta ingerita la compressa è necessario che i pazienti evitino di coricarsi per 30 minuti.	no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO + COLECALCIFEROLO	FOSAVANCE*70MG/2800UI 4CPR	036845028	no	Deve essere assunto solo con acqua di rubinetto (non acqua minerale) almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o medicinale (inclusi antiacidi, integratori di calcio e vitamine) della giornata. È probabile che altre bevande (inclusa l'acqua minerale), alimenti ed alcuni medicinali riducano l'assorbimento di alendronato. per minimizzare il rischio di irritazione esofagea e delle reazioni avverse correlate: deve essere deglutito solo dopo essersi alzati dal letto per iniziare la giornata con un bicchiere colmo d'acqua (non meno di 200 ml). Il paziente deve deglutire FOSAVANCE solo intero. Il paziente non deve frantumare o masticare o sciogliere in bocca la compressa a causa del rischio potenziale che si verifichino ulcerazioni orofaringee. Il paziente non deve distendersi per almeno 30 minuti dopo aver assunto FOSAVANCE e fintanto che non abbia mangiato qualcosa.	no	
		FOSAVANCE*70MG/5600UI 4CPR	036845079	no		no	
		VANTAVO*70MG/5600UI 4 CPR	039641081	no		Deve essere assunto solo con acqua di rubinetto (non acqua minerale) almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o medicinale (inclusi antiacidi, integratori di calcio e vitamine) della giornata. È probabile che altre bevande (inclusa l'acqua minerale), alimenti ed alcuni medicinali riducano l'assorbimento di alendronato. per minimizzare il rischio di irritazione esofagea e delle reazioni avverse correlate: VANTAVO deve essere deglutito solo dopo essersi alzati dal letto per iniziare la giornata con un bicchiere colmo d'acqua (non meno di 200 ml). Il paziente deve deglutire VANTAVO solo intero. Il paziente non deve frantumare o masticare o sciogliere in bocca la compressa a causa del rischio potenziale che si verifichino ulcerazioni orofaringee. Il paziente non deve distendersi per almeno 30 minuti dopo aver assunto VANTAVO e fintanto che non abbia mangiato qualcosa. Non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all'inizio della giornata.	no
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	ZALVISO*15MCG 20X40CPR SUB.	044514038	no	Non frantumare, masticare o ingoiare.	no	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	TWICE - 16CPS 10MG RP	033484015	no	Inghiottire senza masticare.	no	soluzione orale
		TWICE*100MG 16 CPS RP	033484041	no	Inghiottire senza masticare.	no	soluzione orale
		TWICE*30MG 16 CPS RP	033484027	no	Inghiottire senza masticare.	no	soluzione orale
		TWICE*60MG 16 CPS RP	033484039	no	Inghiottire senza masticare.	no	soluzione orale
N02AA03	IDROMORFONE CLORIDRATO	JURNISTA - 14CPR 64MG RP	037396393	no	Inghiottire la compressa intera.	no	
		JURNISTA*16MG 14 CPR RP	037396153	no	Inghiottire la compressa intera.	no	
		JURNISTA*32MG 14 CPR RP	037396278	no	Inghiottire la compressa intera.	no	
		JURNISTA*4MG 14 CPR RP	037396518	no	Inghiottire la compressa intera.	no	
		JURNISTA*8MG 14 CPR RP	037396037	no	Inghiottire la compressa intera.	no	
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	OXICODONE ACC - 28CPR 10MG RP	042060184	no	La somministrazione di compresse masticate o frantumate porta ad un rapido rilascio e assorbimento di una dose potenzialmente fatale di oxicodeone.	no	
		OXICODONE ACC - 28CPR 20MG RP	042060323	no		no	
		OXICODONE ACC - 28CPR 40MG RP	042060463	no		no	
		OXICODONE ACC - 28CPR 5MG RP	042060044	no		no	
		OXICODONE ACC - 28CPR 80MG RP	042060602	no		no	
N02AA55	OXICODONE + NALOXONE	TARGIN*10MG/5MG 28CPR RP	039586159	no	Deglutite intere, non rotte, masticate o schiacciate.	no	
		TARGIN*20MG/10MG 28CPR RP	039586262	no		no	
		TARGIN*40MG/20MG 28CPR RP	039586375	no		no	
		TARGIN*5MG/2,5MG 28CPR RP	039586045	no		no	
	OXICODONE + PARACETAMOLO	DEPALGOS*10+325MG 28 CPR	035313055	n.d.		n.d.	
		DEPALGOS*20+325MG 28 CPR	035313081	n.d.		n.d.	
		DEPALGOS*5+325MG 28 CPR	035313028	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N02AA59	PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	CODAMOL*500+30MG 16CPR RIV	037021021	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	compresse effervescenti, granulato effervescente
N02AB03	FENTANIL	VELLOFENT*67MCG 4CPR SUB	042415063	no	Vellofent non deve essere ingoiato, ma deve disciogliersi completamente nella cavità sublinguale, senza essere masticato o succhiato.	no	cpr orosol., pastiglie per mucosa orale con appl.
	FENTANILE CITRATO	ACTIQ*1200MCG15PAST MUCOS OS	035399195	no	Non masticare.	no	compresse orosolubili, compresse sublinguali
		ACTIQ*1600MCG15PAST MUCOS OS	035399233	no	Non masticare.	no	
		ACTIQ*200MCG 15PAST MUCOS OS	035399031	no	Non masticare.	no	
		ACTIQ*400MCG 15PAST MUCOS OS	035399070	no	Non masticare.	no	
		ACTIQ*600MCG 15PAST MUCOS OS	035399118	no	Non masticare.	no	
		ACTIQ*800MCG 15PAST MUCOS OS	035399157	no	Non masticare.	no	
		EFFENTORA*100MCG 4CPR OROS.	038660015	no	La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita.	no	
		EFFENTORA*200MCG 4CPR OROS.	038660039	no	La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita.	no	
		EFFENTORA*400MCG 4CPR OROS.	038660054	no	La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita.	no	
EFFENTORA*600MCG 4CPR OROS.	038660078	no	La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita.	no			
EFFENTORA*800MCG 4CPR OROS.	038660092	no	La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita.	no			
N02AE01	BUPRENORFINA CLORIDRATO	TEMGESIC*0,2MG 10CPR	025215043	no	Non masticare né inghiottire.	no	
N02AJ13	TRAMADOLO + PARACETAMOLO	KOLIBRI*37,5+325MG 20CPR	036993032	no	Devono essere deglutite intere, non rotte o masticate.	no	compresse effervescenti
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	CONTRAMAL - 20CPR 100MG RP	028853036	no	Le compresse devono essere deglutite intere non divise o masticate.	no	gocce orali soluzione
		CONTRAMAL 150*150MG 10CPR	028853075	no	Le compresse devono essere deglutite intere non divise o masticate.	no	gocce orali soluzione
		CONTRAMAL SR 200 MG 10 CPR	028853087	no	Le compresse devono essere deglutite intere non divise o masticate.	no	gocce orali soluzione
		CONTRAMAL*50MG 20 CPS	028853012	no	Le capsule devono essere deglutite intere, non divise o masticate.	no	gocce orali soluzione
		TRADONAL SR*30 CPS 200 MG	034233041	no		no	gocce orali soluzione
		TRAMADOLO HCT SAN*100MG20CPR	036697035	no	Le compresse devono essere ingerite intere, senza romperle o masticarle.	no	gocce orali soluzione
N02AX06	TAPENT ADOLO (CLORIDRATO)	PALEXIA* 25MG 40 CPR RP	040423840	no	Va assunto intero, senza dividerlo o masticarlo.	no	
		PALEXIA* 50MG 30 CPR RP	040422420	no		no	
		PALEXIA*100 MG 30 CPR RP	040422545	no		no	
		PALEXIA*150 MG 30 CPR RP	040422661	no		no	
		PALEXIA*200 MG 30 CPR RP	040422786	no		no	
N02AX52	TRAMADOLO + DEXKETOPROFENE	LENIZAK*75/25MG 20CPR RV	044089187	si	La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	n.d.	
N02BA01	ACIDO ACETILSALICILICO	ACIDO ACETILS ANG - 20CPR 500MG	030009017	n.d.		n.d.	granulato
		ACIDO ACETILSAL TE - 30CPR 100MG	042207011	no	Le compresse non devono essere masticate, rotte o frantumate.	no	acetilsalicilato di lisina buste
N02BA51	ACIDO ACETILSALICILICO + ACIDO ASCORBICO	ASPIRINA C EFFERV.*20 CPR	004763330	si		n.d.	
N02BE01	PARACETAMOLO	ACETAMOL*1000MG 16CPR EF	023475128	si		n.d.	
		TACHIPIRINA*1000MG 16CPR DIV	012745182	si	Compressa divisibile, con linea di frattura centrale su un lato.	si	gocce, cr orosolubili e scioppo
		TACHIPIRINA*500MG 20 CPR	012745093	si	Compressa divisibile, con linea di frattura centrale su un lato.	si	
N02CC01	SUMATRIPTAN SUCCINATO	SUMATRIPTAN DOC*4CPR RIV 50MG	038111035	si	La compressa può essere divisa in due parti uguali. Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.	no	
N02CC06	ELETRIPTAN BROMIDRATO	ELETRIPTAN DOC*40MG 6 CPR	043436068	no	Le compresse devono essere ingerite intere. I pazienti non devono frantumare né sciogliere le compresse.	no	
N03AA02	FENOBARBITAL	GARDENALE*100MG 20 CPR	004556015	si	Le compresse possono essere disgregate in acqua.	si	
		GARDENALE*50MG 30 CPR	004556027	si	Le compresse possono essere disgregate in un po' d'acqua o eventualmente aggiunte ai cibi.	si	
N03AA03	PRIMIDONE	MYSOLINE*30 CPR 250 MG	009340011	si		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N03AB02	FENITOINA SODICA	DINTOINA*100 MG 30CPR	002129017	si	Nei bambini oltre i 6 anni: 1/2-1 compressa per volta sino a 2-3 al giorno, sempre a stomaco pieno e con un po' d'acqua. Al di sotto dei 6 anni: 1/2-1 compressa al giorno, polverizzata o mescolata con zucchero, marmellata o miele.	si	
N03AE01	CLONAZEPAM	RIVOTRIL*0,5 MG 20 CPR	023159054	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	gocce orali
		RIVOTRIL*2 MG 20 CPR	023159066	si	Le compresse possono essere frazionate in metà o quarti uguali.	n.d.	gocce orali
N03AF01	CARBAMAZEPINA	TEGRETOL*200MG 30 CPR RM	020602049	si	Le compresse a rilascio modificato (sia intere che spezzate a metà) devono essere ingerite, senza masticare.	no	sciroppo
		TEGRETOL*400MG 30 CPR RM	020602052	si		no	sciroppo
		TEGRETOL*200MG 50 CPR	020602013	n.d.		n.d.	sciroppo pediatrico, cr
		TEGRETOL*400MG 30 CPR	020602025	n.d.		n.d.	masticabili
N03AF02	OXCARBAZEPINA	TOLEP*300MG 50 CPR DIV.	028304018	si	La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolare la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali. Tuttavia la compressa non può essere divisa in dosi uguali.	n.d.	
		TOLEP*600MG 50 CPR DIV.	028304020	si		n.d.	
N03AF03	RUFINAMIDE	INOVELON	038217093	si	Le compresse possono essere frantumate.	si	
		INOVELON*100MG 10CPR	038217016	si	Le compresse possono essere frantumate.	si	
		INOVELON*400MG 60CPR	038217143	si	Le compresse possono essere frantumate.	si	
N03AF04	ESLICARBAZEPINA (ACETATO)	ZEBINIX*800MG 30 CPR	039910171	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali.	n.d.	
N03AG01	ACIDO VALPROICO + SODIO VALPROATO	DEPAKIN CHRONO*300MG30CPR RP	022483109	no		no	soluzione orale, granulato a rilascio prolungato
		DEPAKIN CHRONO*500MG30CPR RP	022483111	no		no	
	SODIO VALPROATO	DEPAKIN*200MG 40CPR GASTR.	022483248	no		no	soluzione orale
		DEPAKIN*500MG 40CPR GASTR.	022483251	no		no	soluzione orale
N03AG02	VALPROATO MAGNESIACO	DEPAMAG*40 CPR 200 MG	027107010	no		no	soluzione orale
		DEPAMIDE*300MG 30 CPR GASTR.	023105036	no		no	
N03AG04	VIGABATRIN	SABRIL*50 CPR RIV. 500 MG	027443011	si	La linea di rottura ha come unico scopo quello di semplificare la separazione in due della compressa per renderne più agevole la deglutizione e non per suddividere la dose in due parti uguali.	n.d.	granulato per sospensione orale
N03AX09	LAMOTRIGINA	LAMICTAL - 28CPR DISPERS 5MG	027807066	si	Le compresse possono essere masticate o sciolte in poca acqua.	si	
		LAMICTAL - 56CPR DISPERS 50MG	027807080	si	Le compresse possono essere masticate o sciolte in poca acqua.	si	
		LAMICTAL*100MG56CPR MAS/DISP	027807078	si	Le compresse possono essere masticate o sciolte in poca acqua.	si	
		LAMICTAL*25MG 28CPR MAS/DISP	027807054	si	Le compresse possono essere masticate o sciolte in poca acqua.	si	
N03AX11	TOPIRAMATO	TOPAMAX*15 MG 60 CPS	032023083	si	Possono essere aperte, non masticate.	no	
		TOPAMAX*25 MG 60 CPR RIV.	032023071	no	Non spezzare le compresse.	no	
		TOPAMAX*25 MG 60 CPS	032023095	si	Possono essere aperte, non masticate.	no	
		TOPIRAMATO EG*100MG 60CPR	038314163	no	Deglutire intero.	no	
		TOPIRAMATO EG*50MG 60CPR	038314100	no	Deglutire intero.	no	
N03AX12	GABAPENTIN	NEURONTIN - 50CPS 300MG	028740025	no	Deve essere deglutito intero.	no	
		NEURONTIN*100MG 50CPS	028740013	no	Deve essere deglutito intero.	no	
		NEURONTIN*400MG 30CPS	028740037	no	Deve essere deglutito intero.	no	
N03AX14	LEVETIRACETAM	LEVETIRAC. MYL* 500MG60CP	040329258	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
		LEVETIRACETAM MY - 30CPR 1000MG	040329171	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
N03AX15	ZONISAMIDE	ZONEGRAN*25MG 14 CPS	036959017	n.d.		n.d.	
		ZONEGRAN - 28CPS 50MG	036959094	n.d.		n.d.	
		ZONEGRAN - 56CPS 100MG	036959043	n.d.		n.d.	
		ZONISAMIDE MY - 28CPS 50MG	044836070	n.d.		n.d.	
N03AX16	PREGABALIN	LYRICA*100MG 21 CPS	036476149	no		no	
		LYRICA*150MG 56CPS	036476188	no		no	
		LYRICA*25MG 14 CPS	036476012	no		no	
		LYRICA*300MG 56CPS	036476240	no		no	
		LYRICA*50MG 21CPS	036476075	no		no	
		LYRICA*75MG 56CPS	036476125	no		no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA	
N03AX18	LACOSAMIDE	VIMPAT*100MG 56CPR	038919054	n.d.		n.d.		
		VIMPAT*150MG 14CPR	038919078	n.d.		n.d.		
		VIMPAT*200MG 56CPR	038919116	n.d.		n.d.		
		VIMPAT*50MG 14CPR	038919015	n.d.		n.d.		
N03AX22	PERAMPANEL	FYCOMPA*10MG 28 CPR	042581126	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
		FYCOMPA*12MG 28 CPR	042581153	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
		FYCOMPA*2MG 7 CPR	042581013	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
		FYCOMPA*4MG 28 CPR	042581037	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
		FYCOMPA*6MG 28 CPR	042581064	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
		FYCOMPA*8MG 28 CPR	042581090	no	Non frantumare, masticare, dividere.	no		
N04AA01	TRIESIFENIDILE CLORIDRATO	ARTANE*2MG 50CPR BL.	003488057	n.d.		n.d.		
N04AA02	BIPERIDENE CLORIDRATO	AKINETON*2MG 60 CPR	028330013	n.d.		n.d.		
		AKINETON*4MG 50CPR RIL. PR.	028330037	no		no		
N04AA03	METIXENE CLORIDRATO	TREMARIL*5MG 20 CPR	014136028	n.d.		n.d.		
N04AA11	BORNAPRINA CLORIDRATO	SORMODREN*50 CPR 4 MG	024264018	si	La dose ottimale deve essere stabilita caso per caso aumentando gradualmente la dose iniziale di ½ compressa (2 mg) al giorno; in genere è compressa tra 1½ - 3 compresse (6 - 12 mg) al giorno.	n.d.		
N04BA02	LEVODOPA + BENSERAZIDE	MADOPAR*100+25MG 30 CPR DIS	023142058	no	Comprese dispersibili.	no		
		MADOPAR*100+25MG 30CPS RP	023142045	no	Non aprire, sciogliere o masticare le capsule.	no		
		MADOPAR - 30CPS 100MG+25MG	023142019	no	Non aprire o sciogliere in liquidi.	no		
	LEVODOPA + CARBIDOPA	SINEMET RM*100/25MG 50 CPR	023145042	no	Può essere somministrato solo in compresse intere. Le compresse non devono essere né masticate né triturate.	no		
		SINEMET*100/25MG 50 CPR	023145028	si	Ogni compressa può essere dimezzata	n.d.		
		SINEMET*250/25MG 50 CPR	023145016	si	Ogni compressa può essere dimezzata	n.d.		
N04BA03	LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE	LEV/DOPA + CARBIDOPA HEXAL 200/50MG 30CPR RP	036514053	no	Non rompere o masticare.	no		
N04BA05	MELEVODOPA + CARBIDOPA	LEV/CAR/EN MYL*100+25+200MG	044193124	no	La compressa deve essere somministrata intera.	no		
		LEV/CAR/EN MYL*150+37,5+200M	044193201	no		no		
		LEV/CAR/EN MYL*200+50+200MG	044193288	no		no		
		LEV/CAR/EN MYL*50+12,5+200MG	044193047	no		no		
		LEV/CAR/EN MYL*75+18,75+200M	044193086	no		no		
		LEVODOPA CAR ENT MY - 100CPR125	044193163	no		no		
		SIRIO*12,5+125MG 60CPR EFF	035625060	no		Comprese effervescenti.	no	
SIRIO*25+100MG 60CPR EFF	035625072	no	Comprese effervescenti.	no				
N04BB01	AMANTADINA CLORIDRATO	MANTADAN*100MG 20 CPR	022309013	n.d.		n.d.		
N04BC01	BROMOCRIPTINA MESILATO	PARLODEL 5*5 MG 30 CPS	023781038	n.d.		n.d.		
N04BC04	ROPINIROLO CLORIDRATO	REQUIP*1MG 21 CPR	032261125	n.d.		n.d.		
		REQUIP*2MG 21 CPR	032261149	n.d.		n.d.		
		REQUIP - 28CPR 8MG RP	032261265	no	Devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, frantumate o divise.	no		
		REQUIP*4 MG 28 CPR RP	032261240	no		no		
N04BC05	PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOidrato	MIRAPEXIN - 30CPR 1,05MG RP	034090201	no	Le compresse non devono essere divise, frantumate o masticate.	no		
		MIRAPEXIN*0,26MG 10CPR RP	034090136	no		no		
		MIRAPEXIN*0,52MG 10CPR RP	034090163	no		no		
		MIRAPEXIN*2,1MG 30CPR RP	034090237	no		no		
		MIRAPEXIN*3,15MG 30CPR RP	034090264	no		no		
		PRAMIPEXOLO SAND - 30CPR 0,18MG	040474013	n.d.			n.d.	
		PRAMIPEXOLO SAND - 30CPR 0,7MG	040474037	n.d.			n.d.	
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	JUMEX*10MG 25 CPR	025462021	n.d.		n.d.		
		JUMEX*5MG 50 CPR	025462019	n.d.		n.d.		
N04BD02	RASAGILINA MESILATO	AZILECT*1MG 28 CPR	036983029	n.d.		n.d.		
N04BD03	SAFINAMIDE	XADAGO*50MG 30 CPR	043906039	n.d.		n.d.		

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N04BX01	TOLCAPONE	TASMAR*100 CPR 100 MG	033280049	no	Le compresse di Tasmar sono rivestite con film e devono essere inghiottite intere perché il tolcapone ha un sapore amaro.	no	
N04BX02	ENTACAPONE	COMTAN*200MG 100 CPR	034231035	n.d.		n.d.	
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	LARGACTIL - 20CPR RIV 100MG	007899038	n.d.		n.d.	gocce orali
		LARGACTIL*25MG 25 CPR RIV.	007899026	n.d.		n.d.	gocce orali
N05AA02	LEVOMEPRIMAZINA MALEATO	NOZINAN*100MG 20 CPR RIV.	015228024	n.d.		n.d.	
		NOZINAN*25MG 20 CPR RIV.	015228012	n.d.		n.d.	
N05AB03	PERFENAZINA	TRILAFON*20 CPR RIV. 2 MG	013403023	n.d.		n.d.	
		TRILAFON*20 CPR RIV. 4 MG	013403035	n.d.		n.d.	
		TRILAFON*20 CPR RIV. 8 MG	013403011	n.d.		n.d.	
N05AD01	ALOPERIDOLO	HALDOL*30 CPR 1 MG	025373010	n.d.		n.d.	gocce orali
		HALDOL*30 CPR 5 MG	025373034	n.d.		n.d.	gocce orali
		SERENASE*10MG 20 CPR	016805057	n.d.		n.d.	gocce orali
N05AD06	BROMPERIDOLO	IMPROMEN*5MG 30 CPR	026017020	n.d.		n.d.	gocce orali
N05AE04	ZIPRASIDONE CLORIDRATO MONOIDRATO	ZIPRASIDONE SAN*40MG 56 CPS	041339161	no	Le capsule devono essere deglutite intere senza masticare.	no	
		ZIPRASIDONE SAN*60MG 56 CPS	041339262	no		no	
N05AF05	ZUCLOPENTIXOLO DICLORIDRATO	CLOPIXOL*10MG 30 CPR	026890107	n.d.		n.d.	gocce orali
		CLOPIXOL*25MG 20 CPR	026890119	n.d.		n.d.	gocce orali
N05AH02	CLOZAPINA	CLOZAPINA CHS*25MG 28 CPR	035390018	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali	n.d.	
		CLOZAPINA HEX*100MG 28 CPR	036638221	si	Le compresse possono essere divise in quattro parti.	n.d.	
N05AH03	OLANZAPINA	OLANZAPINA TEV*10 MG 28CPR	040470128	n.d.		n.d.	compresse orodispersibili
		OLANZAPINA TEV*2,5 MG 28CPR	040470015	n.d.		n.d.	compresse orodispersibili
		OLANZAPINA TEV*5 MG 28CPR	040470041	n.d.		n.d.	compresse orodispersibili
		OLANZAPINA TEV*5MG28CPR OROD	040470231	no	La compressa deve essere posta in bocca, dove si disperderà rapidamente nella saliva così da poter essere deglutita facilmente. Poiché la compressa orodispersibile è friabile, essa deve essere assunta immediatamente dopo l'apertura del blister. In alternativa può essere dispersa in un bicchiere piendo d'acqua o di altra bevanda adatta (succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè) immediatamente prima della sua assunzione.	no	
		OLANZAPINA TEV*10MG28CP OROD	040470270	no		no	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	QUETIAPINA ACC - 60CPR 50MG RP	041966223	no	Deglutite intere senza dividere, frantumare o masticare.	no	
		QUETIAPINA AHCL - 30CPR RIV 25MG	041503071	n.d.		n.d.	
		QUETIAPINA AHCL - 60CPR RIV300MG	041503525	n.d.		n.d.	
		QUETIAPINA AUR*100MG 60 CPR	039186325	n.d.		n.d.	
		QUETIAPINA MY - 60CPR 200MG RP	043057088	no	Deglutite intere, non divise, frantumate, masticate.	no	
		QUETIAPINA MY - 60CPR 300MG RP	043057126	no		no	
		QUETIAPINA MY - 60CPR 400MG RP	043057153	no		no	
		QUETIAPINA MYL*150MG 60CPR	043057052	no		no	
		QUETIAPINA SANDOZ - 60CPR 100MG	040968063	si		La compressa può essere divisa in quattro dosi uguali.	n.d.
QUETIAPINA SANDOZ - 60CPR 200MG	040968190	si	n.d.				
N05AH05	ASENAPINA	SYCREST*10MG 60CPR SUB.	040761052	no	La compressa non deve essere frantumata. Deve essere posizionata sotto la lingua, affinché si sciolga completamente. Le compresse sublinguali non devono essere masticate, né inghiottite (la biodisponibilità di asenapina quando ingerita è bassa).	no	
		SYCREST*5MG 60CPR SUB.	040761025	no		no	
N05AH06	CLOTIAPINA	ENTUMIN*40 MG 30 CPR	021553019	n.d.		n.d.	gocce orali
N05AL03	TIAPRIDE CLORIDRATO	ITALPRID - 20CPR 100MG	023913015	n.d.		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N05A05	AMISULPRIDE	AMISULPRIDE EG*50MG 12CPR	037126137	si	Le compresse possono essere divise in parti uguali.	n.d.	
		AMISULPRIDE MYL*200MG 30CPR	039402110	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	
		DENIBAN*50MG 12 CPR	027491012	n.d.		n.d.	
		SOLIAN*200MG 30 CPR	033462021	si	Compresse divisibili.	n.d.	
		SOLIAN*400MG 30 CPR RIV.	033462045	si	Compresse rivestite divisibili.	n.d.	
N05A07	LEVOSULPIRIDE	LEVOPRAID*100MG 20 CPR	026009047	n.d.		n.d.	gocce orali
		LEVOPRAID*50MG 20 CPR	026009050	n.d.		n.d.	gocce orali
		LEVOSULPIRIDE TEVA - 20CPR 25MG	042724031	n.d.		n.d.	gocce orali
		LEVOPRAID*25MG 20 CPR	026009011	n.d.		n.d.	gocce orali soluzione
N05AN01	LITIO CARBONATO	CARBOLITHIUM - 50CPS 150MG	024597015	n.d.		n.d.	
	LITIO SOLFATO	LITIO CARBONATO 300 MG 50 CPR	030543019	n.d.		n.d.	
N05AX08	RISPERIDONE	RESILIENT*83MG 50 CPR RIL PROL	044635011	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Le compresse a rilascio prolungato devono essere deglutite intere con abbondante acqua.	no	
		RISPERIDONE MYL*4MG 60CPR	040616207	si	Le compresse possono essere divise in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
		RISPERIDONE TEV*1MG 60 CPR	038250054	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
		RISPERIDONE TEV*2MG 60 CPR	038250128	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	RISPERIDONE TEVA - 60CPR RIV 3MG	038250193	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
		ARIPIPRAZOLO TEV*15MG 28 CPR	043732155	no	La compressa deve essere posta in bocca sulla lingua, dove si disperderà rapidamente nella saliva. Dato che le compresse orodispersibile sono friabili, devono essere assunte immediatamente una volta fuori dal blister. In alternativa si può disperdere la compressa in acqua e bere la sospensione ottenuta.	no	soluzione orale
		ARIPIPRAZOLO ZNT*10MG 28 CPR	044265078	no	La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.	no	soluzione orale; compresse orodispersibili
		ARIPIPRAZOLO ZNT*15MG 28 CPR	044265128	no	La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.	no	
N05AX13	PALIPERIDONE	ARIPIPRAZOLO ZNT*5MG 28 CPR	044265027	no	Le compresse orodispersibili possono essere utilizzate in alternativa ad Aripiprazolo Zentiva compresse da quei pazienti che hanno difficoltà a deglutire.	no	
		INVEGA*3MG 28CPR RP	038024016	no	La compressa deve essere deglutita intera con un liquido, non deve essere masticata, divisa né frantumata.	no	
		INVEGA*6MG 28CPR RP	038024067	no		no	
INVEGA*9MG 28CPR RP	038024117	no	no				
N05BA	DELORAZEPAM	EN - 20CPR 0,5MG	023593015	n.d.		n.d.	gocce orali
		EN - 20CPR 1MG	023593039	n.d.		n.d.	gocce orali
		EN*20 CPR 2 MG	023593054	n.d.		n.d.	gocce orali
N05BA01	DIAZEPAM	NOAN - 25CPR RIV 5MG	019993017	n.d.		n.d.	gocce orali
		VATRAN*25 CPR 5 MG	020706026	si	Compresse divisibili.	n.d.	gocce orali
N05BA04	OXAZEPAM	SERPAX*15MG 20CPR	020835031	si	Compresse divisibili.	n.d.	
		SERPAX*30MG 20 CPR	020835043	si	Compresse divisibili.	n.d.	
N05BA06	LORAZEPAM	TAVOR*1MG 20 CPR	022531053	n.d.		n.d.	gocce orali, compresse orosolubili
		TAVOR*2,5MG 20 CPR	022531077	n.d.		n.d.	
		TAVOR*1MG 20 CPR OROSOL.	022531103	si	Le compresse orosolubili si sciolgono rapidamente sulla lingua senza bisogno di essere deglutite. Ogni compressa orosolubile presenta una tacca per un eventuale suddivisione.	no	gocce orali, compresse orosolubili
		TAVOR*2,5MG 20 CPR OROSOL.	022531127	si		no	
N05BA08	BROMAZEPAM	BROMAZEPAM MYL*1,5MG 20CPR	036034015	n.d.		n.d.	gocce orali
		LEXOTAN*3MG 20 CPS RIG.	022905121	n.d.		n.d.	gocce orali
		LEXOTAN*6MG 20 CPS RIG.	022905133	n.d.		n.d.	gocce orali
N05BA09	CLOBAZAM	FRISIUM*30 CPS 10 MG	023451014	n.d.		si	preparazione galenica
N05BA11	PRAZEPAM	PRAZENE*10MG 30CPR	023762026	n.d.		n.d.	gocce orali
		PRAZENE*20MG 20 CPR	023762038	n.d.		n.d.	gocce orali

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N05BA12	ALPRAZOLAM	XANAX*0,25MG 20 CPR	025980057	si		n.d.	gocce orali
		XANAX*0,50MG 20CPR	025980069	si		n.d.	gocce orali
		XANAX*1MG 20CPR	025980071	si		n.d.	gocce orali
N05BA19	ETIZOLAM	DEPAS*0,5MG 30 CPR RIV.	025640057	n.d.		n.d.	gocce orali
N05BB01	IDROXIZINA CLORIDRATO	ATARAX*25MG 20 CPR RIV.	010834024	si	Compresse divisibili.	n.d.	sciroppo
N05CD01	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	FLUNOX - 30CPS 15MG	022867028	n.d.		n.d.	
		VALDORM*30 CPS 30 MG	022926036	n.d.		n.d.	
N05CD02	NITRAZEPAM	MOGADON*5MG 20 CPR	020731081	si	Possono essere masticate, ingerite intere o sciolte in acqua.	si	
N05CD03	FLUNITRAZEPAM	ROIPNOL*10 CPR RIV. 1 MG	023328077	si		n.d.	
N05CD04	ESTAZOLAM	ESILGAN*1MG 30 CPR	025053012	si	Compresse divisibili.	n.d.	
		ESILGAN*2MG 30 CPR	025053036	si	Compresse divisibili.	n.d.	
N05CD05	TRIAZOLAM	HALCION*125MCG 20 CPR	024713063	n.d.		n.d.	gocce orali
		HALCION*250MCG 20 CPR	024713075	n.d.		n.d.	gocce orali
N05CD06	LORMETAZEPAM	LORMETAZEPAM SAN*1MG 30CPR	042273019	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	gocce orali
N05CD09	BROTIZOLAM	BROTIZOLAM ABC - 30CPR 0,25MG	040805018	si	Compresa divisibile	n.d.	
N05CF01	ZOPICLONE	IMOVANE - 20CPR RIV DIV 7,5MG	028299016	si		n.d.	
N05CF02	ZOLPIDEM TARTRATO ACIDO	STILNOX*10MG 30CPR	026695015	si	Compresse rivestite con film, divisibili.	n.d.	gocce orali
N06AA04	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	ANAFRANIL*10MG 50 CPR RIV.	021643022	no	Le compresse rivestite devono essere deglutite intere.	no	
		ANAFRANIL*25MG 20 CPR RIV.	021643010	no	Le compresse rivestite devono essere deglutite intere.	no	
		ANAFRANIL*75MG 20CPR R.P.	021643046	si	Le compresse sono divisibili in due metà esattamente uguali.	no	
N06AA09	AMITRIPTILINA CLORIDRATO	LAROXYL*10MG 30 CPR RIV.	019906027	n.d.		n.d.	gocce orali
		LAROXYL*25MG 25 CPR RIV.	019906015	n.d.		n.d.	gocce orali
N06AA10	NORTRIPTILINA CLORIDRATO	NORITREN*25MG 30 CONF.	021153022	n.d.		n.d.	
N06AB03	FLUOXETINA CLORIDRATO	XEREDIEN*20MG 28CPR DISP.	034974042	no	Compresse dispersibili.	no	gocce orali
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO EMIDRATO	SEREUPIN*20MG 28CPR	027965033	si	La compressa può essere divisa, se necessario, in due dosi uguali. Le compresse devono essere deglutite piuttosto che masticate.	no	sospensione orale, gocce orali
N06AB06	SERTRALINA CLORIDRATO	ZOLOFT*100MG 30CPR RIV.	027753110	n.d.		n.d.	concentrato per sol. orale
		ZOLOFT*50MG 30CPR RIV.	027753108	si	Le compresse possono essere divise in parti uguali.	n.d.	concentrato per sol. orale
N06AB08	FLUVOXAMINA MALEATO	FEVARIN*100MG 30 CPR RIV.	027045044	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Le compresse di fluvoxamina devono essere inghiottite con acqua e non masticate.	no	
		FLUVOXAMINA EG*50MG 30CPR	034669059	si	Compresse rivestite con film con una linea di incisione. Le compresse di fluvoxamina devono essere ingerite con acqua, senza masticarle.	no	
N06AB10	ESCITALOPRAM	CIPRALEX*10MG 28 CPR	035767250	si	Le compresse da 10, 15 e 20 mg possono essere divise in due dosi uguali.	n.d.	gocce orali o compresse
		CIPRALEX*20MG 28 CPR	035767375	si		n.d.	orodispersibili
	ESCITALOPRAM OSSALATO	ESCERTAL*10MG 28CPR ORO	042256053	no	La compressa deve essere posta sulla lingua, dove si dissolve rapidamente e può essere deglutita senza acqua. La compressa orodispersibile è fragile e deve essere maneggiata con cura. La compressa non ha una linea di incisione e non può essere divisa in dosi uguali perciò non tutte le dosi possono essere raggiunte. Le dosi da 5 mg e 15 mg devono essere somministrate utilizzando un'altra forma farmaceutica adatta di escitalopram. Escertal compresse orodispersibili è bioequivalente alle compresse rivestite con film di escitalopram, con simile velocità e grado di assorbimento. Ha lo stesso dosaggio e frequenza di somministrazione delle compresse rivestite di escitalopram. Escertal compresse orodispersibili possono essere utilizzate in alternativa alle compresse rivestite con film di escitalopram.	no	gocce orali
		ESCITALOPRAM DOC*20MG28CPR ORODISP	041975044	no		no	gocce orali

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N06AX01	OXITRIPTANO	TRIPT-OH*50MG 30 CPS	024158014	n.d.		n.d.	granulato per sosp. orale
N06AX03	MIANSERINA CLORIDRATO	LANTANON*30 MG 30 CPR	023695036	no	Le compresse vanno deglutite senza essere masticate, se necessario con un po' di liquido.	no	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	TRITTICO*150MG 20CPR DIV RP	022323075	si		no	gocce orali
		TRITTICO*30 CPR DIV. 100 MG	022323048	si		n.d.	gocce orali
		TRITTICO*30 CPR DIV. 50 MG	022323036	si		n.d.	gocce orali
		TRITTICO*75MG 30CPR DIV RP	022323063	si		no	
		TRITTICO*CONTRAMID150MG14CPR	022323113	si		no	gocce orali
N06AX11	MIRTAZAPINA	MIRTAZAPINA EG*30MG 30CPR	036555050	si	Le compresse o le metà compresse devono essere prese per via orale, con una sufficiente quantità di liquido, e vanno deglutite intere senza masticare.	no	compresse orosolubili
		MIRTAZAPINA SAND - 30CPR ORO30MG	037885249	no	Non necessario, sciogliere in bocca.	no	
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	WELLBUTRIN*150MG 30CPR RM	037685029	no	Le compresse devono essere deglutite intere, non devono essere tagliate, frantumate o masticate.	no	
		WELLBUTRIN*300MG 30CPR RM	037685056	no		no	
N06AX16	VENLAFAXINA CLORIDRATO	EFEXOR*150MG 10 CPS RP	028831067	no	Le capsule devono essere ingerite intere con del liquido e non devono essere divise, rotte, masticate o disciolte.	no	soluzione orale
		ZARELIS - 14CPR 75MG RP	038316028	no	Le compresse devono essere ingerite intere con del liquido e non devono essere divise, rotte, masticate o disciolte.	no	soluzione orale
		ZARELIS - 28CPR 37,5MG RP	038316648	no		no	soluzione orale
N06AX18	REBOXETINA METANSULFONATO	EDRONAX*60 CPR 4 MG	033632023	si		n.d.	
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	EZEQUA - 28CPS GASTR 30MG	043548041	no	Si può aprire la capsula e mescolare il contenuto (senza tritare) con succo di mela o spargerlo su purea di mela (non su budino di cioccolato) e somministrare subito. Non somministrare in sonda gastroenterica (granulometria inadeguata, ostruisce la sonda).	no	
		EZEQUA - 28CPS GASTR 60MG	043548066	no		no	
N06AX26	VORTIOXETINA	BRINTELLIX*10MG 28 CPR	043187107	n.d.		n.d.	gocce orali
		BRINTELLIX*20MG 28CPR	043187285	n.d.		n.d.	gocce orali
		BRINTELLIX*5MG 28 CPR	043187020	n.d.		n.d.	gocce orali
N06BA04	METILFENIDATO CLORIDRATO	RITALIN*10MG 30 CPR	035040017	si		n.d.	
N06BA07	MODAFINIL	PROVIGIL*100MG 30CPR	034369013	no	Le compresse vanno inghiottite intere.	no	
N06BA09	ATOMOXETINA CLORIDRATO	STRATTERA*18MG 28 CPS	037063118	n.d.		n.d.	
		STRATTERA*25MG 28 CPS	037063157	n.d.		n.d.	
		STRATTERA*40MG 28 CPS	037063195	n.d.		n.d.	
		STRATTERA*60MG 28 CPS	037063233	n.d.		n.d.	
N06BX12	LEVOCARNITINA ACETIL CLORIDRATO	NICETILE*500MG 30 CPR GASTR	025369048	no		no	polvere per soluzione orale
N06BX13	IDEBENONE	MNESIS*45MG 30 CPR RIV.	027586015	n.d.		n.d.	
N06CA01	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOSSIDO	LIMBITRYL*12,5/5MG 20 CPS	021462066	no	Da ingerire senza masticare.	no	
		MUTABON FORTE*30 CPR RIV.	021460062	n.d.		n.d.	
		MUTABON MITE*30 CPR RIV.	021460074	n.d.		n.d.	
N06DA02	DONEPEZIL CLORIDRATO	ARICEPT - 28CPR ORODISP 5MG	033254210	no	La compressa deve essere posta sulla lingua per potersi disintegrare prima di essere deglutita con o senza acqua.	no	
		DONEPEZIL EG - 28CPR RIV 5MG	040085019	n.d.	La compressa deve essere tenuta sulla lingua fino a completa disgregazione prima di deglutire con o senza acqua.	n.d.	compresse orodispersibili
		DONEPEZIL EG*10MG 28CPR RIV	040085045	n.d.		n.d.	compresse orodispersibili
		DONEPEZIL MYL*10MG 28CPR OR	041088170	no		no	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
N06DA03	RIVASTIGMINA TARTRATO ACIDO	RIVASTIGMINA SAN*1,5MG 56CPS	040904029	no	Le capsule vanno deglutite intere.	no	soluzione orale
		RIVASTIGMINA SAN*3MG 56CPS	040904068	no	Le capsule vanno deglutite intere.	no	soluzione orale
		RIVASTIGMINA SAN*4,5MG 56CPS	040904106	no	Le capsule vanno deglutite intere.	no	soluzione orale
		RIVASTIGMINA SAN*6MG 56CPS	040904144	no	Le capsule vanno deglutite intere.	no	soluzione orale
N06DA04	GALANTAMINA BROMIDRATO	GALNORA - 28CPS 16MG RP	039889314	no	Le capsule devono essere deglutite intere con l'aiuto di liquidi. Non devono essere masticate né frantumate. Per pazienti con difficoltà a deglutire: le capsule possono essere svuotate ed i nuclei delle compresse deglutiti interi con l'aiuto di liquidi. Il contenuto delle capsule (nuclei delle compresse) non deve essere masticato né frantumato.	no	
		GALNORA - 28CPS 24MG RP	039889504	no		no	
		GALNORA - 28CPS 8MG RP	039889136	no		no	
		REMINYL*56 CPR RIV. 12 MG	034752042	n.d.	n.d.		
		REMINYL*56 CPR RIV. 4 MG	034752081	n.d.	n.d.		
N06DX01	MEMANTINA CLORIDRATO	MEMANTINA MYL*10MG 56 CPR	042776094	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	soluzione orale
		MEMANTINA MYL*20MG 28 CPR	042776221	si		n.d.	soluzione orale
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA BROMURO	MESTINON*20 CPR DIV. 60 MG	009286016	n.d.		n.d.	
		MESTINON*50 CPR R.P. 180 MG	009286042	si	Le compresse a rilascio prolungato vengono assunte con una certa quantità di liquido ed hanno un solco centrale che ne consente la frattura per l'eventuale assunzione di metà compressa. La compressa a rilascio prolungato non deve essere frazionata ulteriormente, perché altrimenti verrebbe compromesso il rilascio ritardato del principio attivo.	no	
N07AX01	PILOCARPINA CLORIDRATO	SALAGEN*5MG 84CPR RIV.	029526047	n.d.		no	
N07BB	METADOXINA	METADOXIL*500MG 30CPR	025316011	n.d.		n.d.	sol. orale 500 mg/15 ml
N07BB01	DISULFIRAM	ANTABUSE DISPERGETTES*24 CPR	004308019	si		no	
		ETILTOX*200MG 30 CPR	010681029	n.d.		n.d.	compresse efferv. 400 mg
N07BB03	ACAMPROSATO	CAMPRAL*333MG 84CPR RIV.	034208013	no		no	
N07BC01	BUPRENORFINA CLORIDRATO	BUPRENORFINA MOL*2MG 7CPR	040325045	no	Non deve essere inghiottita, frantumata o masticata.	no	
		BUPRENORFINA MOL*8MG 7CPR	040325072	no		no	
N07BC51	BUPRENORFINA + NALOXONE	SUBOXONE*16+4MG 28 CPR	037604067	no	La compressa deve essere posta sotto la lingua fino a completa dissoluzione.	no	
		SUBOXONE*2+0,5MG 7 CPR	037604016	no		no	
		SUBOXONE*8+2MG 7 CPR	037604030	no		no	
N07CA01	BETAISTINA DICLORIDRATO	BETAISTINA DOC*24MG 20CPR	038782013	n.d.		n.d.	12,5 mg/ml gocce orali o 8 mg/ml gocce orali
		MICROSER*16MG 30 CPR	022628061	n.d.		n.d.	
		MICROSER*8MG 50 CPR	022628034	n.d.		n.d.	
N07CA03	FLUNARIZINA DICLORIDRATO	FLUGERAL - 50CPS 5MG	024414031	n.d.		n.d.	
N07CA52	CINNARIZINA + DIMENIDRINATO	ARLEVERTAN*20MG/40MG 20CPR	037887015	no	Ingerire le capsule intere senza masticarle né romperle in presenza o assenza di cibo.	no	
N07XX02	RILUZOLO	RILUTEK*56CPR RIV. 50MG	032887010	no		no	sospensione
N07XX06	TETRABENAZINA	XENAZINA*25MG 112CPR DIV.	036688012	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Non è noto se la compressa possa essere frantumata.	n.d.	
N07XX07	FAMPRIDINA	FAMPYRA*10MG 56 CPR RP	041298047	no	La compressa deve essere deglutita intera. Non deve essere spezzata, polverizzata, sciolta, succhiata o masticata.	no	
N07XX08	TAFAMIDIS MEGLUMINE	VYNDAQEL*20MG 30CPS	041663016	no	Ingerire le capsule intere senza masticarle né romperle in presenza o assenza di cibo.	no	
N07XX09	DIMETILFUMARATO	TECFIDERA*120MG 14 CPS	043217013	no	Assumere capsule intere con il cibo.	no	
		TECFIDERA*240MG 56 CPS	043217025	no		no	
P01AB01	METRONIDAZOLO	VAGILEN MG 250 CPS	020689028	n.d.		si	se indicato: ovuli vaginali
P01AB02	TINIDAZOLO	TRIMONASE*500 MG 8 CPR	024860025	n.d.		si	
P01BA01	CLOROCHINA	CLOROCHINA*250MG 30 CPR	008366015	si		si	
P01BA02	IDROSSICLOROCHINA SOLFATO	PLAQUENIL*200MG 30CPR RIV	013967056	no		n.d.	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
P01BB51	ATOVAQUONE + PROGUANIL	ATOV/PROG MYL*250+100MG12CPR	040697031	no		n.d.	
		MALARONE*62,5/25MG12CPR RIV.	033299037	si	Nel caso venissero riscontrate difficoltà nella somministrazione ai bambini piccoli, le compresse possono essere frantumate e mescolate con del cibo o con una bevanda a base di latte appena prima della somministrazione.	si	
P01BC01	CHININA SOLFATO	CHIN SO NAR*20CRIV 250MG	030470013	si		n.d.	
P01BC02	MEFLOCHINA CLORIDRATO	LARIAM*250MG 8 CPR	027250024	si	Le compresse possono essere frazionate e sciolte in poca acqua, latte o altra bevanda per la somministrazione ai bambini più piccoli o a persone con difficoltà di deglutizione.	si	
P01BF05	PIPERACHINA + DIIDROARTEMISININA	EURARTESIM*320+40MG 12CPRR	041496047	si	La compressa può essere divisa in dosi uguali.	si	
P02CA01	MEBENDAZOLO	VERMOX*100 MG 6 CPR	023821010	si	Le compresse possono essere deglutite con un po' d'acqua, oppure masticate durante il pasto.	si	soluzione orale
P02CA03	ALBENDAZOLO	ZENTEL*400MG 3 CPR	027096041	si	Le compresse possono essere inghiottite, masticate o spezzate e mescolate al cibo.	si	
R03CC13	CLENBUTEROLO CLORIDRATO	MONORES*20MCG 30CPR	024217034	si	La compressa da 20 mcg può essere divisa in due metà.	n.d.	0,1 mg/100 ml sciroppo
R03DA04	TEOFILLINA	DIFFUMAL*30 CPR 350 MG	025740097	si	Compresse divisibili.	si	0,67% soluzione orale
		RESPICUR*200MG 30 CPS RP	027435080	si	I pazienti che hanno difficoltà a deglutire le capsule intere, possono aprirle ed	no	sciroppo
		RESPICUR*300MG 30 CPS RP	027435155	si	assumere l'intero contenuto con abbondanza di liquidi.	no	sciroppo
R03DA05	AMINOFILLINA	TEFAMIN*30CPR RIV. 200 MG	002021044	n.d.		n.d.	
R03DA11	DOXOFILLINA	ANSIMAR*20 CPR 400 MG	025474014	n.d.		n.d.	sciroppo 2%, bustine 200 mg
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	MONTEGEN - 28CPR FILM RIV 10MG	034003018	n.d.		n.d.	cpr masticabili e granulato
		MONTELUKAST DOC*5MG 28CPR	040471029	si	Compresa masticabile	si	
		MONTELUKAST TEV*10MG 28CPR	040673055	no		n.d.	cpr masticabili e granulato
R03DX07	ROFLUMILAST	DAXAS*500MCG 30CPR RIV.	040107029	no	La compressa deve essere deglutita con acqua.	no	
R05CB01	ACETILCISTEINA	ACETILCISTEINA RAT*600MG30CP	034256026	si	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	si	
		FLUIMUCIL*600MG 30CPR EFFER.	020582209	n.d.		si	
R06AE07	CETIRIZINA DICLORIDRATO	CETIRIZINA ZENTIVA 10 MG COMPRESSE RIVESTITE	037300047	si	Le compresse possono essere divisa in due dosi uguali.	n.d.	gocce
R06AE09	LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO	LEVOCETIRIZINA TEV*5MG20CPR	039265057	no	La compressa rivestita con film deve essere assunta per via orale, ingerita intera con acqua.	no	gocce
R06AX02	CIPROEPTADINA CLORIDRATO	PERIACTIN*4 MG 30 CPR	017616018	n.d.		n.d.	0,4 mg/ml sciroppo
R06AX13	LORATADINA	CLARITYN*10MG 20 CPR	027075011	si	La linea di incisione sulla compressa serve solo per agevolarne la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali. Non è noto se la compressa possa essere frantumata	n.d.	sciroppo e compresse effervescenti
R06AX17	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	ZADITEN*2MG 15 CPR RP	024574042	no	Le compresse a rilascio prolungato devono essere ingoiate intere.	no	sciroppo
R06AX26	FEXOFENADINA CLORIDRATO	FEXOFENADINA SFV*120MG 20CPR	033304041	n.d.		n.d.	
		TELFASST COMPRESSE 180 MG	033303037	n.d.		n.d.	
R06AX29	BILASTINA	ROBILAS*20MG 20 CPR	041045028	si	La linea di incisione sulla compressa serve solo per agevolarne la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali. La compressa deve essere deglutita con acqua. Non è noto se la compressa possa essere frantumata	n.d.	
R07AX02	IVACAFTOR	KALYDECO*150MG 56 CPR	043519026	no	I pazienti devono essere avvisati di ingerire le compresse intere (non devono cioè masticare, rompere o dissolvere le compresse).	no	
R07AX30	LUMACAFTOR + IVACAFTOR	ORKAMBI*200MG/125MG 112 CPR	044560011	no	I pazienti devono essere avvisati di ingerire le compresse intere. Non devono cioè masticare, rompere o dissolvere le compresse.	no	
S01EC01	ACETAZOLAMIDE	DIAMOX*250MG 12 CPR	009277017	si		si	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME FARMACO	AIC	DIVISIB./ APRIBILE	NOTA RCP	TRITUR.	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
V01AA02	ESTRATTI ALLERGENICI, POLLINE DI GRAMINACEE	ORALAIR*100IR+300IR 31CPRSBL	039857014	no	Le compresse devono essere poste sotto la lingua fino a completa dissoluzione (almeno 1 minuto) e in seguito deglutite.	no	
		ORALAIR*300IR 30CPR SBL	039857026	no		no	
		ORALAIR*300IR 90CPR SBL	039857038	no		no	
V03AC02	DEFERIPRONE	FERRIPROX*1000MG 50 CPR RIV.	034525042	si	La compressa può essere divisa in due metà uguali.	n.d.	soluzione orale
		FERRIPROX*500MG 100 CPR RIV.	034525016	si		n.d.	soluzione orale
V03AC03	DEFERASIROX	EXJADE*125MG 28CPR	037421017	no	Le compresse vengono disciolte mescolandole in un bicchiere d'acqua o di succo d'arancia o di mela (100–200 ml), fino a ottenere una sospensione fine. Le compresse non devono essere masticate né ingerite intere	no	
		EXJADE*250MG 28CPR	037421031	no		no	
		EXJADE*500MG 28CPR	037421056	no		no	
		EXJADE*180MG 30CPR	037421144	si	si	cpr dispersibili	
		EXJADE*360MG 30CPR	037421171	si	si	cpr dispersibili	
V03AE02	SEVELAMER	REVELA*800MG 180 CPR	039480037	no	Le compresse devono essere ingerite intere e non devono essere schiacciate, masticate o spezzettate prima della somministrazione.	no	buste
	SEVELAMER CLORIDRATO	RENAGEL*180 CPR RIV. 800 MG	034676080	no	Non frantumare, masticare o rompere in pezzi prima della somministrazione.	no	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	FOZNOL*1000MG 90 CPR	037097209	si	Le compresse devono essere completamente masticate e non ingerite intere. Per facilitare la masticazione le compresse si possono frantumare.	si	buste
		FOZNOL*500MG 90 CPR	037097134	si		si	buste
		FOZNOL*750MG 90 CPR	037097096	si		si	buste
V03AE04	CALCIO ACETATO + MAGNESIO CARBONATO PESANTE	OSVAREN*435MG/235MG 180CPR	038540011	si	La linea di frattura serve solo per agevolare la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.	no	
V03AE05	OSSIDROSSIDO SUCROFERRICO	VELPHORO*500MG 90 CPR	043564020	si	Le compresse devono essere masticate e non inghiottite intere; possono essere sbriciolate.	si	
V03AF	CALCIO MEFOLINATO PENTAIDRATO	PREFOLIC*30 CPR GASTR. 15 MG	024703124	no	Le compresse sono gastroresistenti, non vanno masticate, ma debbono essere deglutite intere.	no	
V03AF03	CALCIO FOLINATO	CALC FOLINATO SAN*10CPR 15MG	028367011	n.d.		n.d.	4 mg soluzione orale
		FOLIDAR*15 MG 30 CPR	028489021	n.d.		n.d.	
		SANIFOLIN*10 CPR 15 MG	027683010	n.d.		n.d.	
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO PENTAIDRATO	FOLANEMIN*4MG 30 CPR	034815050	si	Comprese con linea di prerottura su un lato.	n.d.	2,5 mg granulato
		LEDERFOLIN*7,5MG 10 CPR	024659118	n.d.		n.d.	
V03AH01	DIAZOSSIDO	PROGLICEM*100MG 100CPS	023060039	n.d.		si	
		PROGLICEM*25MG 100CPS	023060027	n.d.		si	
V04CD01	METIRAPONE	CORMETO*250MG 50 CPS MOLLI	043094010	no		no	
V04CX	UREA-13C	EXPIROBACTER*100MG 1CPR+GRAT	034183018	no	Una compressa per via orale, disciolta in una soluzione nella quale è stata appena disciolta una bustina da 1,4g di acido citrico, utilizzato per rallentare lo svuotamento gastrico. Nei bambini il dosaggio di (13C –Urea) può essere dimezzato.	n.d.	
V06DD	AMINOACIDI CHETOANALOGHI + LISINA + TREONINA + TIROSINA	ALFA KAPPA*100 CPR RIVESTITE	026363010	no		no	
V09FX03	SODIO IODURO 131I	SODIO IODURO131I MALL*1CPS 3	039009016	no	La capsula deve essere assunta per via orale e a digiuno con abbondante liquido e deve essere deglutita intera.	no	soluzione orale