

COUNSELING E COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE IL PHARMACY CLINICAL DESK (PCD) DEL CRO DI AVIANO

Gestione dell'aderenza terapeutica, delle interazioni e delle ADRs nei trattamenti oncologici

Obiettivi

- Monitorare l'aderenza alla terapia oncologica
- Rilevare *errori terapeutici, near miss, Adverse Drug Reactions (ADRs)*
- Valutare la soddisfazione dei pazienti che afferiscono al PCD


Risultati

Introduzione

Il trattamento delle patologie oncologiche spesso comprende anche terapie concomitanti e di supporto prescritte da molteplici specialisti. Ciò potrebbe condizionare l'aderenza al trattamento, aumentare l'insorgenza di interazioni farmacologiche ed errori di assunzione oltre a trascurare possibili ADRs. In questo contesto, il farmacista clinico riveste un ruolo chiave di supporto informativo, influisce significativamente sulla diminuzione dei rischi per il paziente e ne migliora la gestione del percorso di cura.

Materiali e Metodi

Nell'ambito del Progetto "Changing the future: can we effectively improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?" (RF-2016-02364211) il PCD ha arruolato 278 pazienti, seguiti per massimo 24 mesi. Di questi viene valutata l'aderenza alla terapia mediante questionario di Morisky e consultazione in cartella clinica. Eventuali interazioni farmacologiche e rilevazioni precoci di possibili rischi o danni (near miss) sono individuate consultando almeno 3 banche dati. Le ADRs rilevate sono segnalate in VigiFarmaco e inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Al termine del follow up è valutata l'opinione del paziente sul servizio offerto mediante questionario.




■ Aderenza su 72 pazienti


Tutti i pazienti in studio sono risultati aderenti al trattamento. Il grafico evidenzia la variabilità in 6 mesi di follow-up della terapia orale in base al punteggio Morisky; per la terapia infusionale Morisky non è applicabile e si classificano come aderenti i pazienti che l'hanno effettuata.

Near miss rilevati

Attualmente lo studio ha rilevato 357 near miss a seguito dei quali è avvenuta una correzione di terapia.



■ Interazioni ■ Errato dosaggio
■ Inappropriatezza prescrittiva ■ Inappropriatezza uso



Le interazioni totali rilevate finora sono state 322. Le azioni intraprese hanno comportato monitoraggio nel tempo o rivalutazioni tra cui cambio o sospensione di farmaco/integratore previa consultazione medica.

ADRs Segnalate

ADRs farmaco	N° rilevato	Percentuale
Gravi	17	28,3%
Non gravi	43	71,7%
Totale	60	

Lo studio ha permesso di segnalare finora 60 reazioni avverse.

Conclusioni

Il servizio del counseling favorisce un rapporto più approfondito con il paziente, aumenta la rilevazione precoce di ADRs e near miss ed orienta verso percorsi mirati e valutazioni cliniche specialistiche. Tutto ciò favorisce un approccio sempre più personalizzato, migliora la qualità di vita del paziente e aumenta l'aderenza alla terapia, già di per sé elevata visto il forte senso di responsabilità riscontrato nei trattamenti oncologici.

Autori

Dal Mas L (1), Caccin E (1), Crestan D (1), Tommasi F (1), Orzetti S (1), Ferrarin E (2), Zambon C (3), Baldo P (1).

(1) SOSD Farmacia Centro di Riferimento Oncologico IRCCS CRO di Aviano

(2) Biblioteca Scientifica e per Pazienti Centro di Riferimento Oncologico IRCCS CRO di Aviano

(3) SOSD Psicologia Oncologica Centro di Riferimento Oncologico IRCCS CRO di Aviano

Progetto grafico: Riccardo Bianchet, Direzione Scientifica Centro di Riferimento Oncologico IRCCS CRO di Aviano

