

PROVA SCRITTA

(sufficienza 21/30)

Prova scritta	Griglia valutazione		Tot. punti
3 domande a risposta aperta ognuna delle quali vale massimo 10 punti, per le quali i candidati avranno a disposizione un massimo di 10 righe ciascuna. I criteri di valutazione sono: <ul style="list-style-type: none"> • Pertinenza e completezza; • Conoscenza tecnica; • Lessico; • Sintesi. 	Punti	Motivazione	30 punti
	10	Ottimo	
	9,5	Buono	
	8,7	Discreto	
	7,7	Più che sufficiente	
	7	Sufficiente	
	5,3	Insufficiente	
	2	Gravemente insufficiente	
0	Risposta non data		

PROVA SCRITTA 1 – sorteggiata

DOMANDA 1: Il/La Candidato/a illustri le indicazioni alla profilassi antibiotica dell'endocardite batterica nella pratica clinica dell'igienista dentale.

DOMANDA 2: Il/La Candidato/a illustri le modalità di utilizzo del Fluoro secondo le “Linee Guida Nazionali per la Promozione della Salute Orale e la Prevenzione delle Patologie orali in età evolutiva” (agg. 2013).

DOMANDA 3: Il/La Candidato/a illustri le differenze tra ablatori ultrasonici piezoelettrici e magnetostrittivi.

PROVA SCRITTA 2 – non sorteggiata

DOMANDA 1: Il/La Candidato/a illustri gli obiettivi e le fasi di trattamento della parodontite di stadio IV.

DOMANDA 2: Il/La Candidato/a definisca la MIH e le problematiche correlate.

DOMANDA 3: Il/La Candidato/a indichi gli effetti collaterali da utilizzo della Clorexidina.

PROVA SCRITTA 3 – non sorteggiata

DOMANDA 1: Il/La Candidato/a illustri gli obiettivi e le fasi di trattamento della malattia parodontale di stadio II-III.

DOMANDA 2: Il/La Candidato/a definisca la sigillatura dei solchi nei molari permanenti e il metodo di esecuzione.

DOMANDA 3: Il/La Candidato/a illustri la curva di Stephan nei processi di demineralizzazione e remineralizzazione.

PROVA PRATICA

(sufficienza 14/20)

Prova pratica	Griglia valutazione		Tot. punti
Un unico quesito i candidati avranno a disposizione 20 righe. I criteri di valutazione sono: <ul style="list-style-type: none"> • Pertinenza e completezza; • Conoscenza tecnica; • Lessico; • Sintesi. 	Punti	Motivazione	20 punti
	20	Ottimo	
	19	Buono	
	17	Discreto	
	15	Più che sufficiente	
	14	Sufficiente	
	10	Insufficiente	
	3,5	Gravemente insufficiente	
	0	Risposta non data	

PROVA PRATICA 1 – non sorteggiata

DOMANDA 1. Il paziente oncologico testa/collo: approccio e gestione da parte dell'igienista dentale.

PROVA PRATICA 2 – non sorteggiata

DOMANDA 1. L'ipertrofia gengivale nel paziente trapiantato di rene: approccio e gestione da parte dell'igienista dentale.

PROVA PRATICA 3 – sorteggiata

DOMANDA 1. Il paziente pediatrico ortodontico: approccio e gestione da parte dell'igienista dentale.

PROVA ORALE

(sufficienza 14/20)

LINGUA INGLESE		
Punteggio		Motivazione
0	/0,25	errata
0.25	/0,25	corretta

INFORMATICA		
Punteggio		Motivazione
0	/0,25	errata
0.25	/0,25	corretta

PROFESSIONALE		
Punteggio		Motivazione
Da 1 a 9	/19,5	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE.
Da 10 a 11	/19,5	MOLTO INSUFFICIENTE.
Da 12 a 13	/19,5	INSUFFICIENTE.
Da 14 a 14,5	/19,5	SUFFICIENTE
Da 15 a 15,5	/19,5	Più CHE SUFFICIENTE.
Da 16 a 17,5	/19,5	DISCRETO.
Da 18 a 19	/19,5	BUONO.
19,5	/19,5	OTTIMO.

N^	Inglese	Informatica	Professionale
1	The recently published Clinical Practice Guidelines (cpgs) for the treatment of stages I-IV periodontitis provided evidence-based recommendations for treating periodontitis patients, defined according to the 2018 classification.	La funzione Aggiorna di qualsiasi browser permette di: a) caricare nuovamente una pagina Web b) salvare la pagina corrente	Fasi e obiettivi della SPIC (Supportive peri-implant care) secondo le linee guida dell' EFP (European Federation of Periodontology) pubblicate nel 2023.
2	Peri-implant diseases were also re-defined in the 2018 classification. It is well established that both peri-implant mucositis and peri-implantitis are highly prevalent.	In Microsoft Excel, il simbolo per realizzare una moltiplicazione è: a) * b) ^	L'utilizzo delle terapie aggiuntive nella terapia non chirurgica subgengivale della parodontite dallo stadio I al III secondo le linee guida EFP (European Federation of Periodontology) pubblicate nel 2020.
3	In addition, peri-implantitis is particularly challenging to manage and is accompanied by significant morbidity.	Se, in Excel, nella cella A1 digitiamo la formula "=3+A2", il risultato: a) dipenderà dal valore digitato nella cella A2 b) la formula è errata	Fasi e obiettivi della terapia della parodontite di stadio IV secondo le linee guida EFP (European Federation of Periodontology) pubblicate nel 2022.

N^	Inglese	Informatica	Professionale
4	Peri-implant diseases are inflammatory conditions that affect the peri-implant tissues and are induced by peri-implant biofilms.	In Microsoft Excel, la funzione SE rientra nella categoria delle funzioni di tipo: a) logico b) grafico	La nuova classificazione della malattia parodontale.
5	There are two distinct conditions: peri-implant mucositis and peri-implantitis. Peri-implant mucositis is an inflammatory lesion of the peri-implant mucosa, in the absence of continuing marginal bone loss.	Tutte le unità collegate esternamente all'unità centrale di un computer vengono chiamate: a) unità periferiche b) unità output	La gestione del paziente pediatrico sottoposto a terapia chemio e/o radio secondo le "Linee guida ministeriali per la promozione della salute orale e la prevenzione della patologie orali negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a terapia chemio e/o radio" aggiornate al 2018.
6	Peri-implant mucositis it is characterized clinically by bleeding on gentle probing.	Come si chiama l'unità minima di rappresentazione di un dato? a) byte b) record	La gestione della mucosite nel paziente radiotrattato testa collo causa carcinoma squamocellulare.
7	Other clinical signs of inflammation may be present, such as erythema, swelling and/or suppuration, and an increase in probing depth (PD) is frequently observed in the presence of peri-implant mucositis due to edema or a decrease in probing resistance.	La memoria ROM è a) di lettura e calcolo b) di sola lettura	La gestione dell'igiene orale domiciliare nel paziente onco-ematologico con mucosite.
8	The primary etiological factor for peri-implantitis onset and progression is the accumulation of a peri-implant plaque biofilm.	Quando è eseguito un programma, questo viene caricato: a) in memoria RAM b) direttamente sul disco fisso	L'osteonecrosi dei mascellari farmaco-correlata: misure di prevenzione e gestione odontoiatrica secondo le raccomandazioni SIPMO (Società Italiana Patologia e Medicina Orale) del 2024.
9	Important risk factors/indicators have been identified, including a history of severe periodontitis, poor plaque control and no regular supportive peri-implant care (SPIC) following implant therapy.	Cosa indica la sigla MP3? a) una memoria temporanea del computer b) uno standard di compressione audio	La gestione del paziente in terapia con TAO o NAO.

N^	Inglese	Informatica	Professionale
10	Other factors such as the absence of peri-implant keratinized mucosa (PIKM), occlusal overload, presence of titanium particles within peri-implant tissues, bone compression necrosis, overheating, micromotion or biocorrosion have been proposed as risk factors for peri-implant diseases onset and/or progression, but further research is required to clarify their true roles.	Un "crash" in informatica è: a) un blocco o un errore imprevisto di un programma o del sistema b) la cancellazione di spazi di memoria	La gestione della seduta di igiene orale professionale nel paziente dializzato.
11	Peri-implant diseases, especially peri-implantitis, represent a growing public health problem due to their high prevalence and the associated consequences (implant and implant-supported prosthesis loss), including dental care costs, which are substantial.	Quale tra questi utilizza la tecnologia VOIP? a) Skype b) Firefox	La gestione da parte dell'igienista dentale della donna in gravidanza.
12	To better understand the pathophysiology of peri-implant diseases, knowledge of the pathophysiology of periodontal diseases has been extensively used, and findings on peri-implant mucositis have been likened to those of biofilm-induced gingivitis.	Se si inserisce un'intestazione all'interno di una pagina, l'intestazione: a) verrà inserita in tutte le pagine del documento, a meno che non sia specificato diversamente b) verrà in ogni caso inserita in tutte le pagine del documento	La gestione della xerostomia nel paziente pediatrico oncologico sottoposto a chemio e/o radio terapia secondo le "Linee guida ministeriali per la promozione della salute orale e la prevenzione della patologie orali negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a terapia chemio e/o radio" aggiornate al 2018.
13	The same applies to peri-implantitis and periodontitis. However, when compared with periodontal tissues, peri-implant tissues lack cementum and periodontal ligament; thus, there are only two peri-implant tissue layers, alveolar bone and peri-implant mucosa.	Quale tra queste estensioni non è un formato valido per immagini? a) Docx b) Tiff	Problematiche orali riscontrabili nel paziente radiotrattato testa collo per carcinoma squamocellulare.

N^	Inglese	Informatica	Professionale
14	Additional differences are found in the peri-implant mucosa: the peri-implant epithelial attachment is usually longer; the connective tissue exhibits no fibres inserting into the supra-crestal area and vascularization is lower.	Quale tra queste è una periferica di input? a) tastiera b) stampante	La gestione del paziente con disturbo dello spettro autistico.
15	Peri-implant biofilms are considered to be the primary aetiological factor for peri-implant mucositis, based on strong evidence derived from animal and human studies.	Che cos'è un router? a) un dispositivo di rete b) un programma all'interno di un modem	Segni clinici di riconoscimento della Medication Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ) secondo le raccomandazioni di SIPMO (Società Italiana Patologia e Medicina Orale) del 2024.