

PRIORITA'	PRINCIPIO ATTIVO	NOME SPECIALITA' / GALENICO	VIA SOMM.	INDICAZIONE	POSOLOGIA	DURATA DELLA TERAPIA	Prezzo Unitario	DOTAZIONE ARCS MAGAZZINO CENTRALIZZATO	DOTAZIONE ASUFC P.O. UDINE	DOTAZIONE ASUFC P.O. SAN DANIELE	DOTAZIONE ASUFC P.O. TOLMEZZO	DOTAZIONE ASUFC P.O. LATISANA	DOTAZIONE ASUFC P.O. PALMANOVA	DOTAZIONE ASFO P.O. PORDENONE	DOTAZIONE ASUGI P.O. CATTINARA/MAGGIORE	DOTAZIONE ASUGI P.O. GORIZIA/MONFALCONE	DOTAZIONE BURLO	DOTAZIONE CRO	dosaggio pediatrico (consigliato confronto con CAV)
1	ALCOL ETILICO	966926 [ALCOOL (733433198) ETILICO 96% 10ML ASTUCCIO 10 FIALE]	EV	alcoli glicoli (es. metanolo, glicole etilenico)	da concordare con lo specialista del CAV	2-4 GG	3,80 €	200	90	0	0	0	0	320	50	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	20	0	dose di carico 10 ml/kg al 10% in glucosata al 5% ev in 30 minuti. infusione di mantenimento 1,5 ml/kg/h ev (etanolo al 10%) contemporaneamente alla dose di carico (bisogna ottenere un livello ematico di etanolo nel siero di 100-150 mg/dl). Poiché l'etanolo viene rimosso durante dialisi, raddoppiare le dosi in caso di dialisi.
1	ANDEXANET ALFA	1037206 [ONDEXXYA 200MG EV POLV PER INF 4FL [T.MIN2 MAX8]]		inattivatore specifico apixaban e rivaroxaban	BOLO:400-800 MG MANTENIMENTO: 4-8 mg/min in 120 min	singola somministrazione		12 - in fase di valutazione	20						12	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk			
1	Fattore II di coagulaz. del sangue umano + fattore VII di coagulaz. del sangue umano + fattore IX di coagulaz. del sangue umano + fattore X di coagulaz. del sangue umano + proteina C + proteina S	998898 PRONATIV 500UI 1FL+1FL+SET	EV	trattamento di pazienti adulti trattati con anticoagulanti orali inibitori diretti del fattore Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) nei casi in cui si renda necessaria l'inattivazione rapida dell'effetto anticoagulante; interventi chirurgici o manovre invasive ad alto rischio di sanguinamento da eseguire in urgenza, con tempistiche non compatibili con la sola sospensione dell'anticoagulante; sanguinamento potenzialmente fatale o	BOLO:400-800 MG MANTENIMENTO: 4-8 mg/min in 120 min	singola somministrazione	124,50 €	100	20	14	14	10	10		20 IN IMMUNOTRASFUSIONALE DI CATTINARA	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk		0	
1	ATROPINA SOLFATO	970020 [ATROPINA SOLFATO MNC IM IV 1MG/ML 10F]	EV	carbamati esteri organo fosforici agenti nervini ipertono colinergico (funghi del genere Clitocybe e Inocybe)	bolii da 1 mg fino a scomparsa della broncorrea e delle secrezioni da ipertono colinergico. Possibilità di infusione continua (da concordare con lo specialista del CAV)	1-4 GG	0,11 €	2000	160	20	100	20	20	600	500	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	20	0	EV: 0.02 mg/kg/dose; min dose: 0.1 mg - max dose 0.5mg. Ripetere e titolare con goal di riduzione broncorrea Nelle intossicazioni da gas nervino aumentare la dose a 0,05mg/kg nei lattanti o 2mg dose nei bambini
1	BICARBONATO DI SODIO	984298 [SODIO (744343121) BICARBONATO 8,4% MNC EV 500ML 20FC] 965759 [SODIO (744243121) BICARBONATO 8,4% MNC EV 250ML FC] 980541 [SODIO BICARBONATO 8,4% (744149121) MNC EV 100ML 30FC]	EV	alcalinizzazione di plasma e urine, cardiotossicità da farmaci (es. chinidina, antidepressivi triciclici), aumento escrezione urinaria di alcuni farmaci (es. fenobarbitale, acetilsalicilico), sostanze metemoglobinizzanti oppure shock distributivo oppure neurotossicità da ifosfamide	variabile in rapporto all'indicazione di utilizzo	1 GG	1,25 €	200 (500ML) 200 (250ML) 500 (100ML)	30 (100 ml)	20 (250 ml)	40 (250 ml)	30 (100 ml)	30 (100 ml)	72 (250ml)	60 (500 ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	12	0	EV: 0.5- 2 mEq/kg/dose (max 50 mEq/dose) in 5-15min ;se overdose da bloccanti canali del sodio indicata infusione
1	BLU DI METILENE (METILTILIONINO)	989507 [METILTILIONINIO CLORURO BIN IV 100MG/10ML 10F] 991316 [METILTILIONINIO CLORURO PROVEBLUE INIET 50MG/10ML 5F]	EV	sostanze metemoglobinizzanti oppure shock distributivo oppure neurotossicità da ifosfamide	1-2 mg/kg in 5 minuti. La ripetizione della somministrazione dipende dall'indicazione d'uso. Non superare i 7 mg/Kg in 24 ore. Controindicato nei pazienti con deficit di G6PD	1 GG	6,9 - 7,45	200 da 100mg/10ml 30 da 50mg/ml	10	0	20 (100mg/10ml)	0	0	30	30 (100 mg/ 10ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	10 fl (50 mg/10 ml)	EV: 1 to 2 mg/kg in 5-30min; singola dose max 100mg. b.<3m o neonati: 0,3-0,5mg/kg (0,03-0,05ml/kg) in 5min. Controindicato nei pazienti con deficit di G6PD
1	CALCIO CLORURO DIIDRATO 10%	962048 [CALCIO CLORURO BIO 1G IV 10ML 10F]	EV (CVC)	ipocalcemie gravi per ingestione di fluoruri e ossalati (es. antruggine)	1 fiala diluita in 100 ml di soluzione fisiologica in 5-10 minuti, seguita da mantenimento da concordare con lo specialista del CAV	1-2 GG	0,22 - 0,16	300	70	20	30	0	0	40	60	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	20	0	EV: 20mg/kg in 10-20sec
1	CALCIO GLUCONATO 10%	967991 [CALCIO GLUCONATO GSE 10% IV 10F 10ML] (esaurire prima dai buffer 1038551 [CALCIO GLUCONATO MON 10% 10ML 10F]) 1015725 [CALCIO GLUCONATO (744243267) 6% 250ML FL] 991922 [CALCIO GLUCONATO MNC (744343267) 6% 500ML]	EV (periferica)	ev: ipocalcemie per ingestione di fluoruri e ossalati (es. antruggine)	2-3 fiale in 5-10 minuti, seguita da mantenimento da concordare con lo specialista del CAV	7-14 GG	0,20 €	300	30	20	30	10	0	50	60 (1 g/10ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	EV: 100mg/kg in 3-5min;
1	CARBONE ATTIVATO	1038880 [CARBONE (800997) ATTIVO 10G POLVERE] 1013491 [CARBONE VEGETALE (D0054) 500MG 200CPR BARATTOLO]	OS	adsorbente aspecifico	0,5-1 g/Kg. Possibili somministrazioni ripetute. 2-5 g/ora se necessaria dialisi intestinale	1-3 GG	0,54 €	200 GRAMMI (polvere) 200cpr (cpr)	n. 5 fc scioppo galenico 20% ml 500	0	0	0	0	15 barattori/buste 10g	50 barattoli da 10 g	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10 barattori/buste 10g	0	OS: 0.5-1gr/kg seguiti da 0.25-0.50 g/kg ogni 2-3 ore per 3-4 volte
1 E 2	DANTROLENE	1113396 AGILUS 120MG POLV. EV 6FL (è da esaurire nei reparti le ultime scorte di 994569 [DANTRIUM 20MG IV 36FL])	EV	(priorità 1): ipertermia maligna e ipertermia da altri agenti (priorità 2): sindrome maligna da neurolettici	(priorità 1): 1-2 mg/kg rapidamente, ripetibile fino a un max di 10 mg/Kg (priorità 2): 1-2 mg/Kg (max 100 mg) ogni 6 ore	1 o più somministrazioni 1 - 4 GG	64,59 €	18	12	0	0	0	0	144 di 994569 DANTRIUM 20MG IV 36FL	12	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	36	36 rianim	EV: Iniziale 2.5 mg/kg, quindi 1- 2.5 mg/kg ogni 5 min se post-crisi: 1 mg/kg/dose ogni 4- 6 h
1	DIAZEPAM	1013426 [VALIUM 10MG/2ML EV IM 2ML 5F]	EV	clorochina	2 mg/Kg in bolo in 30 minuti (con adeguata assistenza respiratoria) seguito da 1-2 mg/Kg nelle 24 ore	1 GG	1,00 €	500	30	80	30	5	5	70	50	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	EV: 0,15 to 0,2 mg/kg/dose in 5min
1	EMULSIONI LIPIDICHE 20%	1009074 [INTRALIPID (831826170) 20G/100ML12 SACCHE 500ML]	EV	cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardiovascolari	bolo 1,5 ml/Kg 0,25-0,5 ml/Kg/min	da concordare con lo specialista del CAV	12,72 €	24	12	0	0	0	0	20	12	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	soluzione al 20%: 1,5 ml/kg in bolo ev in 1 minuto, seguito eventualmente da altre 2 dosi bolo a distanza di 5 minuti
1	FISOSTIGMINA SALICILATO	1015823 [ANTICOLIUM 2MG/5ML 5FL [ESTERO]]	EV	sindrome anticolinergica centrale	1 mg in 10 ml di fisiologica in infusione lenta (3 min) da ripetere se necessario secondo prescrizione specialista del CAV	1 GG	10,10 €	MODULO	5	0	0	0	0	40	10	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	0,02-0,06 mg/Kg/dose in infusione endovenosa lenta (5minuti) con massimo di 0,5 mg/dose. La dose può essere ripetuta dopo 20 minuti se non si osserva una risposta. La dose
1	FLUMAZENIL	988874 [FLUMAZENIL HIKMA 1MG 10ML 5F]. 993319 [FLUMAZENIL HIK 0,5MG 5ML 5F]	EV	benzodiazepine	0,5 - 2 mg in bolo lento, ripetibile (o seguito da infusione continua, da concordare con lo specialista del CAV)	1-2 GG	1,46 - 0,9 €	300 da 1mg, 300 da 0,5mg	35 (1mg/1ml)	10 (1mg/1ml)	30 (0,5mg/5ml)	5 (0,5mg/5ml)	20 (0,5mg/5ml)	50	30 (1mg/10ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	EV: 0.01-0.02mg/kg/dose ev (massimo 0,2 mg) ripetibile fino ad 0,4mg/kg (max 1mg totale) totale od eventualmente in infusione a 5-40mcg/kg/min EV: 0,04mg/kg
1	FOMEPIZOLO	FOMEPIZOLE 1G/ML EV 1,5ML F [ESTERO]	EV	glicole etilenico metanolo	dose iniziale di 15 mg/kg: a seguire dosi da 10 mg/kg ogni 12 ore e in base alla consulenza del CAV	2-4 GG	634,07 €	MODULO	4	0	0	0	2	0	4	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYKTz7TBtBtqspvMfMOB2p6toVpw5/view?usp=drivesdk	10	0	

1	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE	996799 [DIGIFAB 40MG 1F [OVINE] [ESTERO] [T:MIN2 MAX8]] ad esaurimento per 1110442 [DIGIFAB (FAR0269) DIGOXIN IMUNNE FAB 40MG 1F [ESTERO] [T:MIN2 MAX8]]	EV	digossina glucosidi simil-digitalici (oleandrina)	dose da calcolare in rapporto alla digossinemia o ai mg di glucosidi assunti in sovradosaggio	1 GG	1.442,00 €	MODULO	6	0	0	0	0	10	10	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	1	0	somministrare 80 mg di FAB per ogni mg di digitale assorbito; Nei bambini se non è possibile stimare la dose ingerita o determinare la digossinemia e si è certi della diagnosi si possono somministrare 5 fiale ripetibili entro 60 minuti se non vi è risposta clinica mentre negli adulti fino a 10 fiale
1	GLUGAGONE	976036 GLUCAGEN HYPOKIT FL 1MG+SIR. [T:MIN2 MAX8]	EV	beta bloccanti	5 -10 mg in bolo, mantenimento di 1-5 mg/ora	1 G	9,85 - 10,6 €	30	50	1	2	1	1	60	90	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	5	0	Ipoglicemia: Se paziente <20kg 0.5mg im, se >20kg 1mg im ripetibile dopo 5-10min Se intossicazione da Betabloccanti: 5mcg/kg endovena. Si può ripetere dopo 10minuti; in caso di risposta ovvero aumento della pressione e della frequenza cardiaca,
1	IDARUCIZUMAB	1002441 [PRAXBIND 2.5G/50ML IV 2FL [T:MIN2 MAX8]]	EV	inattivatore specifico per dabigatran	5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Possibile la somministrazione di una seconda dose	singola somministrazione	1.059,80 €	16	6	2	2	4	4	10	4	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	ai momento mpm in uso il dabigatran in pediatria, ma in fase di valutazione	0	
1	IDROSSICOBALAMINA	992899 [CYANOKIT 5G 1FL+SET+DISP.+CAT]	EV	cianuri	5 g in 10 minuti. Possibili somministrazioni ripetute fino a 20 g.	singola somministrazione	678,00 €	5	2	0	0	0	0	2	8	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	2	0	EV: 70 mg/kg in infusione singola; max dose 5,000 mg/dose; ripetibile una seconda dose a 70 mg/kg
1	MAGNESIO SOLFATO	935548 [MAGNESIO SOLFATO 30G BUSTE (A0396)]	OS	catartico	10-30 g nell'adulto. Possibili somministrazioni ripetute	1-2 GG	0,16 €	200	5	2	0	0	2	40	30	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	0	0	non si usa in pediatria solitamente
1	NALOXONE	1105565 [NALOXONE BBRAUN 1ML 0.4MG 10F] 1107234 [NALOXONE CLORIDRATO MOLteni F 0.4MG 1ML F SOL. INIET] 1107226 [NALOXONE CLORIDRATO SALF 0.4MG 1ML 5F]	EV	oppioidi	0,4 - 4 mg in bolo. Possibili somministrazioni ripetute o infusione continua	1-2 GG	0,38 €	300	20	10	10	10	10	25	60	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	0	EV: dose iniziale 0,01-0,02mg/kg/dose max 0,2mg; ripetibile 0,1-0,2mg ogni 2min (al bisogno) max 2mg/dose EN: 0,1-0,2mg/kg/dose con la possibilità di ripetere la somministrazione a 0.1.
1	PARAFFINA LIQUIDA OLIO DI VASELINA	992242 [PARAFFINA LIQUIDA STERILE (OLIO DI VASELINA) 10ML 10 FIALE] 1036279 [PARAFFINA (A0455C) LIQUIDA FU 1000ML] 1008020 [OLIO (A0449) DI VASELINA API 200ML]	OS	derivati del petrolio solventi	10-100 ml	singola somministrazione	0,88 - 3,82 - 5,73 €	20	1 (1000 ml)	0	0	0	0	4	5 (OLIO (A0449) DI VASELINA API 200 ML)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	2	0	
1	POLIETILENGLICOLE 400 (PEG 400)	POLIETILENGLICOLE 400 (PEG 400) PH EUR 0,5KG	TOPICO	decontaminazione cutanea da fenoli	uso topico/ quantità necessatria in rapporto alla superficie contaminata	singola applicazione		DA ACQUISIRE	DA ACQUISIRE	0	0	0	0		2 (flac da 1000 ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	0	0	
1	POLIETILENGLICOLE 3350/4000 (PEG 3350/4000, MACROGOL 4000, ASSOCIAZIONI)	1112632_MACROGOL AURO 10G 20BUST (esaurire dai buffer 972323 [LAXIPEG 9,7G OS 20BUST])	OS	catarsi / lavaggio intestinale	Disciogliere il contenuto di una bustina in almeno 125 ml (pari ad un bicchiere) di acqua.	da 2 h a 1 GG	0,17 - 0,50 €	600 buste di MACROGOL AURO 10G 20BUST [ANTIDOTO]	20 LAXIPEG 9,7G OS 20BUST	60 LAXIPEG 9,7G OS 20BUST	100 LAXIPEG 9,7G OS 20BUST	20 LAXIPEG 9,7G OS 20BUST	20 LAXIPEG 9,7G OS 20BUST	64	320 (LAXIPEG 9,7G OS 20BUST)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	0	Se <6aa: 500 mL/hour tramite SNG; se >6aa: 1500-2000ml/h
1	PROTAMINA	1101625 [PROTAMINA SOLFATO EV 1400U/ML 5ML 5F]	EV	eparina	variabile in rapporto al tempo trascorso dalla somministrazione dell'eparina (da concordare con lo specialista del CAV)	da concordare con lo specialista del CAV	0,54 - 1,99 - 2,24 €	200 fl	40 PROMIN 1% EV 5ML FL	10 PROMIN 1% EV 5ML FL	4 PROTAMINA MEDA 50MG 5 ML F	10	10	8	50 PROTA 10 MG 5ML 25FL [ESTERO]	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	nei reparti	se sovradosaggio da infusione ev di eparina: somministrare ev 1 mg di protamina cloridrato o solfato per ogni 100 U.I. di eparina se il sovradosaggio è da meno di 30min; 500-750mcg se è avvenuto tra 30-60min; 375-500 se tra 60-120min; 250- OS: 20mg se <10kg; 40mg sopra i 10kg
1	SIMETICONE	966000 [SIMETICONE IBI OS GTT 30ML]	OS	sostanze schiumogene	variabile in relazione alla quantità di schiumogeno ingerita	singola somministrazione	2,87 €	40	5	0	0	1	1	10	5	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	5	0	
1	SODIO TIOSOLFATO	984216 [SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO) MNC 10% (G1/10ML) 5F 10ML EV]	OS EV SC	ingestione di ipoclorito di sodio (candeggina, varechina) cianuri	1-5 fiale in pari quantità di acqua (per ottenere una soluzione al 5%) in unica somministrazione 8-16 g/die	singola somministrazione	0,73 - 0,99 €	60	20	10	0	0	0	70	20	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	5	Nell'intossicazione da cianuro amministrare prima il sodio nitrito seguito immediatamente dal sodio tiosolfato Sodio nitrito: 6 mg/kg (0.2 mL/kg o 6-8 mL/m2 di una soluzione 3%); dose massima : 300 mg (10 mL di una soluzione 3%); se i sintomi ritornano è possibile ripeterlo a metà della dose
1	PIRIDOSSINA CLORIDRATO (Vitamina B6)	988746 [BENADON 300MG IM 2ML 6F [ESTERO]]	EV	isoniazide idrazina monometili idrazina (funghi del genere gyromitra) glicole etilenico	fino a 20 g al giorno	possibili somministrazioni ripetute	0,93 €	MODULO	90	0	0	0	0	60	90	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	6	0	Se non si conosce quantitativo ingerito, nel bambino somministrare 70mg/kg ev mentre in adulto 5gr a 0,5mg/min; può essere ripetuta in pazienti con convulsioni. In intossicazione da glicol etilenico si possono somministrare 50-100mg ev
1	FITOMENADIONE (Vitamina K)	1007338 [KONAKION 10MG/ML 1ML OS EV 5F] 976880 [KONAKION 2MG 0,2ML OS IM EV 5FE]	EV	anticoagulanti warfarinici, dicumarolici e superwarfarinici (ad es ratticidi)	5-10 mg fino a 10-50 mg da 2 a 4 volte al giorno (da concordare con lo specialista del CAV)	1-3 giorni (settimane o mesi per i superwarfarinici)	0,9 - 0,5 €	500	20	10 (10mg/ml)	20 (10mg/ml) 10 (2mg/0,2ml)	5 (10mg/ml)	5 (10mg/ml)	42	40 (10mg/ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	0	come antagonista 0.03 mg/kg/dose
2	N-ACETILCISTEINA	967109 [HIDONAC 5G IV 25ML FL]	EV	paracetamolo, funghi contenenti amanitina, solventi epatotossici altri agenti epatotossici e ossidanti	dose carico di 150 mg/kg in 90 minuti, seguita da mantenimento di 300 mg/kg/24 ore	3-7 GG	11,28 €	50	10	5	3	5	5	20	10	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	20	0	
2	ACIDO FOLICO	FOLSAURE HEVERT 5MG 2ML 100F [ESTERO] [FOLINA 15 MG/2 ML 5 FE]	IM EV	metanolo	1 mg/kg/4 ore fino ad un massimo di 50 mg/dose	1-2giorni			40FL di FOLINA 15 mg	0	0	0	0		100 FOLSAURE HEVERT 5MG 2ML 100F [ESTERO]	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	prendiamo FOMEPIZOL O	0	
2	CALCIO LEVOFOLINATO	1022168 [CALCIO LEVOFOLINATO TEVA GENERICS 175MG IV 1FL [T:MIN2 MAX8]] 1022804 [CALCIO LEVOFOLINATO TEVA GENERICS SOL. RTU 1 100 MG FIALE EV [T:MIN2 MAX8]] 988679 IL LEVOFOLINE 25MG IV 1 FL1	EV	metotrexate, pirimetamina trimetoprim	posologia variabile in relazione all'indicazione di utilizzo, da concordare con lo specialista del CAV	1-3 GG	6,11 - 4,88 - 4,63 - 3,04 €	100 da 100mg	40 fl da 25 mg	5 da 100mg	0	0	0	10	40 da 25 mg	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	0	
2	BROMOCRIPTINA MESILATO	993081 PARLODEL 2,5 MG 30 CPR	OS	sindrome maligna da neurolettici	2,5-5 mg ogni 8 ore (nei casi gravi è richiesto trattamento per più giorni)	2-4 GG	0,08 - 0,10 €	60	30	0	0	0	0	90	30	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	10	0	
2	CALCIO GLUCONATO IN GEL 2,5%	GALENICO	TOPICO	contatto cutaneo con fluoruri e ossalati (es. antiruggine)	applicazione secondo prescrizione dello specialista del CAV	variabile (giorni-settimane)		NON GESTITO	galenico disponibile n. 3 conf da 150q	0	0	0	0		gel magistrale preparazione estemporanea	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	2	0	
2	CIPROEPTADINA	1010311 [PERIACTIN 4MG 30CPR] 100651 [PERIACTIN 0,4MG/ML SCIR 150ML FL]	OS	sindrome serotoninica	4-8mg ogni 1-4 ore	2-4GG	0,08 - 4,12 €	30 cpr 1 FL	30	0	30	0	0		30 cpr	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTB/-0tspPrM0B2p6d0Vw5/view?usp=drives&	0	0	

2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	100333 [LARGACTIL 50MG/2ML IM 5F]	EV	sindrome serotoninica	25-50 mg	1 o più somministrazioni	0,59 €	50	5	10	0	0	0	15	10	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10(facciamo sciroppo di clorpromazin a)	0	
2	FRAMMENTI ANTICORPALI SIERO CONTRO IL VELENO DI VIPERA	1028447 [VIPER VENOM ANTITOXIN 500 A.U./5ML IM 1F [ESTERO] [T-MIN2 MAX8]] 1112288 VIPERAFAM 4ML F [ESTERO] [ANTIDOTO] [T-MIN2 MAX8] 1021955 [VIEKVIN 5ML F [ESTERO] [T-MIN2 MAX8]] (indisponibile)	EV	morso di vipera	1 - 2 fiale	singola somministrazione	264,00 €	MODULO	4 VIPER VENOM ANTITOXIN 500 A.U./5ML IM 1F	0	0	1	1	8	4 VIPER VENOM ANTITOXIN 500 A.U./5ML IM 1F	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	2	0	
2	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	1013711 [BERINERT 1500IU IV 1FL+1FL] 955060 [BERINERT 500UI IV 1FL+1F] 1098505 [ICATIBANT TE 30MG SC 3ML SIR.]	EV SC	trattamento e profilassi preintervento degli episodi acuti di angioedema ereditario terapia sintomatica degli	20 UI/Kg singola iniezione, ripetibile dopo 6 ore	singola somministrazione 12 ore	1.595,79 - 531,92 €	6 icaltiban	2 ICATIBANT 30 mg/ 3 ml	0	0	0	0	1	2 conf ICATIBANT BERINERT 500 UI in Pronto Soccorso Cattinara	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	1		
2	LEVOCARNITINA	967305 [CARNITENE 1G/5ML EV IM 5F] 994518 [CARNITENE 2G/5ML IV 5 F] 1018004 [NICETILE 500MG EV 4ML 5FE [T-MIN2 MAX8]]	EV	iperammoniemia epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	dose iniziale: 100 mg/Kg in 30 min, seguita da 15 mg/Kg ogni 4 h in 10-30 min	1 GG	0,81 - 1,41 - 2,31 €	200	20	0	0	0	0	40	240 CARNITENE 2G/5ML IV 5 F	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	20	0	
2	MANNITOLO	991745 [MANNITOLO 10% (B000065) FKI 500ML EV 20FC VETRO] 989653 [MANNITOLO (B000067) 18% FKI IV 500ML 20FL] 1008940 [MANNITOLO (B000063) 18% 250 ML VETRO 24FL] 1008935 [MANNITOLO FRESENIUS (B000059) 18% 100ML VETRO 49FLACI]	EV	intossicazione da ciguatosina grave tossicità da vitamina A	1 g/kg in 30-45 minuti 0,25 - 1 g/kg	da concordare con lo specialista del CAV		400	49 (18% 100ml)	49 (18% 100ml)	49 (18% 100ml)	49 (18% 100ml)	49 (18% 100ml)	0	49 (18% 100ml)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10	0	0,5-1,5gr/kg in 30-60min ripetibile ogni 4-6ore
2	NEOSTIGMINA	1033231 [SYNTOSTIGMIN 0,5MG/1ML 10F [ESTERO]] (in quanto cessata commercializzazione di 117239 [INTRASTIGMINA 1ML 0,5MG 6F])	EV IM SC	ileo paralitico e altri sintomi periferici da anticolinergici curari	1 fiala: possibili somministrazioni ripetute	singola somministrazione	0,11 - 0,30 €	500	60 SYNTOSTIGMIN 0,5MG/1ML 10F [ESTERO]	20	90	0	0	24	60 SYNTOSTIGMIN 0,5MG/1ML 10F [ESTERO]	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10	0	
2	OCTREOTIDE	994200 [OCTREOTIDE BIN 1MG/5ML 1FL [T-MIN2 MAX8]] 992819 [OCTREOTIDE BIN 0,1MG 1ML 10F [T-MIN2 MAX8]] 991997 [OCTREOTIDE BIN 0,5MG 1ML 10F [T-MIN2 MAX8]] 992997 [OCTREOTIDE BIN 0,05MG 1ML 10F [T-MIN2 MAX8]] (unica che si ordina su richiesta)	EV SC	ipoglicemia da sulfaniluree o chinino-indotta in insufficienza renale	Adulto: 50-100 mcg ogni 6-12 h, fino a 50 mcg/h (max 1500 mcg/die)	1 giorno (eventuali variazioni nella durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV)	12,94 - 0,92- 3,90 - 1,02 €	200 da 0,5 400 da 0,1	20	20 da 0,5mg 40 da 0,1mg	40 da 0,5 mg 30 da 0,1 mg	0	10 da 0,1 mg	0	20 (0,1MG 1ML 10F)	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10	0	
2	PRALIDOSSIMA	100290 [CONTRATHION INF 200MG 10FL] 1002556[CONTRATHION INF 200MG POLVERE-SOLVENTE 1+1FL] 1109000 [CONTRATHION INF 2% (200MG/ML) 10F [ESTERO]]	EV	esteri organofosforici	bolo da 1-2 g. In seguito infusione di 500 mg/ora	3-7 GG	2,65 - 13,2 €	60	60	10	50	10	10		100	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10	0	
2	TIAMINA (VITAMINA B1)	965731 [BENERVA 100MG/1ML IM 6 F] ad esaurimento per 992579 [VITAMINA B1 SALF 100MG/2ML 5F]	EV IM	alcol etilico, glicole etilenico ifosfamide	100 - 200 mg (in rari casi fino a 1000 mg)	possibile somministrazione ripetuta	0,32 - 0,39 €	120	12	0	0	0	0	40	12 da 100MG/1ML [BENERVA 100MG/1ML IM 6 F]	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	5	0	
2	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C)	967972 [VITAMINA C SALF 1000MG/5ML 5F] 994546 [VICI MONICO 500MG IM IV 5ML 5F]	EV	metaemoglobinemia	fino a 24 g/die	possibili somministrazioni ripetute	0,19 - 0,50 €	300	100	0	0	0	0	90	100 [1.000 MG/5ML 5F]	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	10	0	
3	CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA) 10%	1022635 [SODIO CALCIO EDETATO SALF 1G/10ML FIALE] 967222 [SODIO EDETATO 1% 1ML]	EV	piombo (cadmio, rame, zinco, manganese, alcuni radioisotopi)	fino a 4-5 g/die	possibile somministrazione ripetuta	1,4 - 1,5 €	40	0	0	0	0	0	20	0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	DEFEROXAMINA MESILATO	1034971 [DEFEROXAMINA NORIDEM 500MG 10F] ad esaurimento per 100295 [DESFERAL 500MG/5ML 10F+10F]	EV	ferro alluminio	15 mg/Kg/ora (fino a max 6 g/die)	possibile somministrazione ripetuta	1,97 €	40	20	10	0	0	0	20	0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	DMPS (acido 2,3 dimercapto 1 - propansolfonico unilitolo) ^(E)	DIMAVAL		mercurio piombo polonio e cobalto	3-5 mg/Kg ogni 4 ore per 4-6 gg (segue somministrazione per os)	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV		NON GESTITO	NON ACQUISIRE	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	FENTOLAMINA			crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti stravaso da agenti	1-5 mg da ripetere al bisogno 5 - 10 mg in 10-15 ml fisiologica	sinogla somministrazione		NON GESTITO	NON ACQUISIRE	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	PENICILLAMINA	1038303_CUPRENIL 250MG 30CPR [ESTERO] 1105974_CUPRIPEN 250MG 30CPR [ESTERO] 984602 [D-PENICILLAMINA 150MG CAPSULE RIGIDE - PENICILLAMINA CLORIDRATO] (ancora indisponibile)	OS	rame, morbo di Wilson (mercurio, piombo, zinco, oro, arsenico, cadmio) cistinuria	1-1,5 g/die (dosi crescenti fino a max 2g/die) suddivisi in 3-4 somministrazioni/die	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV	0,69 - 0,58 €	MODULO	0	0	0	0	0	100	50	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	PROPLITIOURACILE	975304 [PROPYCIL 50MG 60CPR [ESTERO]]	OS	ipertiroidismo da farmaci	75-600 mg/die	durata del trattamento da concordare con lo specialista	0,01 €	MODULO	60	0	0	0	0	100	60	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
3	SUCCIMER (DMSA) ^(E)	RIFERIRSI AL CAV DI PAVIA	OS	arsenico, lewisiti mercurio piombo	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV	dose d'attacco: 10-30 mg/Kg ogni 8 ore per 5 gg dose di mantenimento: 10-30 mg/kg ogni 12 ore per 14 gg		NON GESTITO	0	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
4	AMILE NITRITO	AMILE NITRITO SALF FL INAL 0,3ML/ 1ML	soluzione inalatoria	cianuri antidoto da usare in fase extraosp o nelle grandi emergenze nell'impossibilità di disporre di antidoti più sicuri ed efficaci	rompere 1-2 fl su garza e far inalare per 30 secondi ogni 3 min non superare metaHb del 30%	Somministrazione temporanea, fino a intervento con altri antidoti di prima scelta		NON GESTITO		0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
4	SIERO ANTIBOTULINICO	RIFERIRSI AL CAV DI PAVIA	EV	botulismo	contattare il CAV	singola somministrazione		NON GESTITO	0 su attivazione del MINISTERO SALUTE	0	0	0	0		0 su attivazione del MINISTERO SALUTE	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk	0	0	
4	ARGATOBRAN	983887 [NOVASTAN 100MG/ML 1FL]	EV	trombocitopenia da eparina inibizione diretta della trombina	2-10 mg/kg/min	DA CONCORDARE CON IL CAV	188,01 €	4	3	2	0	0	0	2	2	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	
4	BLU DI PRUSSIA		OS	cesio talio	adulti: 3g ogni 8 ore (18 capsule/die) bambini (2-12 anni): 1 g ogni 8 ore donne gravide o in allattamento: 130 mg/die	SOMMINISTRAZIONE RIPETUTA		NON GESTITO	ACQUISIRE	0	0		0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-0tspPrmMOB2p4d0Vpw5/view?usp=drivesdk		0	

4	DIETILENTRIAMNOPENTAACETATO DI CALCIO (Ca-DTPA) E DI ZINCO (Zn-DTPA)		EV	nuclidi di metalli pesanti transuranici: americio, plutonio, curio, clifornio, bekrkelio, torio e ittrio		DA CONCORDARE CON IL CAV		NON GESTITO	NON ACQUISIRE	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0	
4	DIMERCAPROLO	BAL	IM												0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&			
4	GLUCARPIDASE	VORAXAZE		riduzione tossicità da metotrexate in pz con insufficienza renale	50 unità/kg in 5 minuti	singola somministrazione-ripetibile in alcuni casi		NON GESTITO	MA DA CONSIDERARE CON ONCOEMATOLOGIA	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0 ma da considerare con oncologia	
4	IMMUNOGLOBULINE ANTIRABBICA	994833 [BERIRAB 300UI 2ML SIRINGA [ESTERO] [T.MIN2 MAX8]]	IM	profilassi rabbia	20 UI/Kg	singola somministrazione	490 - 196 €		n. 10 BERIRAB 300UI 2ML SIRINGA carente il 750U	2 da 750UI	0	0	0	22	presente in Pronto Soccorso Cattinara	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0	
4	IODURO DI POTASSIO	PREPARATO GALENICO 1037275 [IODURO POTASSIO 130MG CPR [SELLA]]	OS	iodio radioattivo	adulti (da 18 anni e adolescenti peso corporeo >70 Kg): 130 mg/die bambini (3-18 anni): 65 mg/die bambini (1 mese-3 anni): 32 mg/die neonati: 16 mg/die	da concordare con lo specialista del CAV		384.030 cpr fatte allestire su richiesta Regione 1037275 [IODURO POTASSIO 130MG CPR [SELLA]]	1.474.560 cpr da Ministero Salute deposito per ASUFC	0	0	0	0		52.806 conf da 20 cp ≈1.056.120 cp del Ministero Salute	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&	0	0	
4	SIERO ANTIDIFTERITE ^(E)	RIFERIRSI AL CAV DI PAVIA		difterite				NON GESTITO	0	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0	
4	SIERO ANTIMALMIGNATTA	RIFERIRSI AL CAV DI PAVIA	EV	vedova nera maimignatta morso di ragni appartenenti al genere Latrodectus	rivolgersi al CAV	generalmente singola somministrazione		NON GESTITO	NON ACQUISIRE	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0	
4	VACCINO ANTIRABICO	1015295 [RABIPUR 1FL+1SIR PRERIEMPITA [T.MIN2 MAX8]	IM	immunizzazione attiva per la rabbia	1 fl in urgenza, le successive somministrazioni possono essere ripetute presso gli ambulatori della propria ASL	singola somministrazione in urgenza	45,70 €	80	4	2	2	1	1	10	2	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		0	
4	URIDINA TRIACETATO ^(E)	VISTOGARD	OS	tossicità da 5-fluorouracile o capecitabina	10 g (1 busta) ogni 6 h per 20 dosi (5 giorni). Iniziare il trattamento tra 3 h e 4 giorni dopo la somministrazione di 5-fluorouracile o capecitabina	5 GG		NON GESTITO	NON ACQUISIRE	0	0	0	0		0	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&		COME DA NOTA CAV PAVIA E' IN USO COMPASSIO NEVOLE PER PAZ SI ORDINA DALLA DITTA	

ANTIDOTI PER STRAVASO

AGRAFO DI	DEXRAZOXANO CLORIDRATO	1024178 [SAVENE IV 20MG/ML POLVERE CONCENTRATA +SOLVENTE 10FL+3FL EV 500MG]	EV	stravaso di antracicline	in base alla superficie corporea	3GG	8.280,00 €	1	1 in UFA	0	0	0	0	0	SAVENE 10FL	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&	1	su richiesta tratti individuale	
AGRAFO DI	DIMETILSULFOSSIDO - DMSO 99%	PREPARATO GALENICO	TOPICO	stravaso di antracicline e antibiotici non antracliclinici (mitomicina)	applicazioni topiche di 1-2 ml su un'area di dimensioni doppie rispetto a quella interessata dall'infiltrazione, ogni 2 h per le prime 24 h e	fino a 14 giorni		NON GESTITO	0 tutto nei reparti	0	0	0	0		1 flac 10ml GALENICO UFFICINALE	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&	5	1 FLAC 1000 ML (da usare per ripartizione)	topico ogni 6-8h per 7-14gg
AGRAFO DI	JALURONIDASI	1039907 [HYLASE DESSAU IM 300 UI 10F [T.MIN2 MAX8] [ESTERO]] 1040767_HYLASE DESSAU ESTEVE 300 UI 10F [T.MIN2 MAX8] [ESTERO] (in sostituzione di 1028975 [HYNIDASE 1500UI 20F [ESTERO]]) 963357 [JALURONIDASI 300 UI 3 FIALE+SOLV] (richiamo per contaminazione) <i>Al momento il dosaggio da 300 UI non è disponibile da nessun Fornitore estero, acquisteremo il dosaggio da 150UI (in fase di contratto)</i>	SC	stravaso di etoposide, alcaloidi della vinca e taxani	iniezioni sottocute di 100-150 UI in 5 iniezioni da 0,2 ml intorno all'area interessata	singola somministrazione	22,95 - 19,6 €	MODULO	0 solo nei reparti	0	0	0	0	0	9 fl (JALURONIDASI 300 UI 3 FIALE	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&	1	10 fl (JALURONIDASI 300 UI 3 ML)	4-5 iniezioni sc o id da 0,2ml separate di soluzioni 150 units/mL, ripetibile entro le prime 3-4h
AGRAFO DI	SODIO TIOSOLFATO - IPOFOSFITO DI SODIO	984216 [SODIO TIOSOLFATO (IPOFOSFITO) MNC 10% (G1/10ML) 5F 10ML EV] (esaurite dal buffer 1112752 [NATRIUMTHIOSULFANT 10% 10ML EV 25F [ESTERO]])	OS EV	stravaso di mecloretamina, oxaliplatino, cisplatino e carboplatino	1-5 fiale in pari quantità di acqua (per ottenere una soluzione al 5%) in unica somministrazione	singola somministrazione	0,73 - 0,99 €	60	20	10	0	0	0	70	20	https://drive.google.com/file/d/1PUJasSYXTzTzTB-qlsPrvMfMB2jg6dVjw5/view?usp=drives&	10	5	Nell'intossicazione da cianuro amministrare prima il sodio nitrito seguito immediatamente dal sodio tiosolfato.